



El uso indebido de drogas y la consulta de emergencia. Segundo Estudio Nacional

Provincia de La Rioja 2005

**Observatorio Argentino de Drogas
Área de Investigaciones
Agosto 2007**

**SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO**
José Ramón Granero
Secretario de Estado

OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS
Diego Alvarez Rivero
Coordinador

ÁREA DE INVESTIGACIONES
Graciela Ahumada
Coordinadora

Viviana Ávila
Coordinación de campo en la provincia

ÍNDICE

I INTRODUCCIÓN

II OBJETIVOS

III METODOLOGÍA

- Muestra
- Instrumentos
- Trabajo de campo

IV RESULTADOS

- Descripción de los pacientes encuestados
- Análisis de la relación entre el consumo y la consulta de emergencia
- Análisis comparativo 2003-2005

V CONCLUSIONES

I INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través de su Observatorio Argentino de Drogas (OAD) realizó en octubre del año 2005 el Segundo Estudio Nacional sobre la relación entre el uso indebido de drogas y la consulta de emergencia. La investigación consistió en la aplicación del cuestionario estandarizado del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (SIDUC) en los hospitales públicos de las ciudades capitales del país.

La investigación fue cofinanciada por SEDRONAR y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Observatorio Argentino de Drogas realizó la dirección técnica, coordinación del trabajo de campo, capacitación de técnicos y elaboración del informe final.

El trabajo de campo en cada ciudad capital de las provincias fue coordinado por un técnico provincial designado por el representante del COFEDRO¹. El desarrollo de la investigación implicó la capacitación de profesionales y técnicos de cada una de las provincias y la sensibilización del personal médico, técnicos, enfermeros y administrativos de los hospitales públicos más importantes del país. En este sentido, aproximadamente 800 personas estuvieron trabajando en relación al estudio. El trabajo de campo se llevó a cabo durante la semana del 15 al 21 de octubre del año 2005, durante las 24 horas, en el hospital público de mayor atención en servicios de guardia de cada una de las capitales provinciales.

El Observatorio Argentino de Drogas ya cuenta como antecedente con el Primer Estudio Nacional en pacientes en salas de emergencia realizado en el año 2003. A partir de esta segunda observación, se podrá analizar si se produjeron cambios o variaciones.

Con el desarrollo de esta investigación, el Observatorio Argentino de Drogas creado en el año 2005 avanza en el cumplimiento de sus objetivos incorporando datos epidemiológicos nacionales y provinciales al Sistema de Información y fomentando la creación y el desarrollo de los observatorios provinciales. La posibilidad de contar con estudios epidemiológicos que den cuenta de la relación

¹ Consejo Federal de las Drogas, SEDRONAR

entre el consumo de drogas y en este caso la consulta de emergencia, habilita y abre un espectro aún desconocido de los riesgos y las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas mostrando la necesidad de extender y profundizar la capacitación específica a profesionales médicos y de las áreas salud para que puedan identificar y abordar la problemática.

II OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es evaluar la relación entre la consulta de emergencia de los hospitales públicos y el consumo de sustancias psicoactivas estableciendo comparaciones con el estudio del año 2003.

Objetivos Específicos

1. Conformar un sistema nacional de alarma temprana sobre consumo y abuso de sustancias psicoactivas.
2. Conocer las causas que motivan las consultas y el perfil sociodemográfico de los pacientes, específicamente de aquellos cuya consulta estuvo en relación al consumo de sustancias.
3. Capacitar a recursos humanos locales de los hospitales públicos en el registro, sistematización y análisis de información de base sobre el consumo de sustancias psicoactivas.
4. Comparar los resultados entre los estudios 2003 y 2005.

III METODOLOGÍA

Muestra

Se seleccionaron un total de 22 hospitales públicos del territorio nacional, en el caso específico de la provincia de La Rioja el estudio se llevo a cabo en el Hospital Regional Enrique Vera Barros Soria, que se encuentra bajo la dirección del Dr. Carlos Omar Robador.

El criterio de selección del hospital público se definió a partir del mayor volumen de atención de guardia de la capital provincial, en la mayoría de las provincias el estudio fue realizado en la misma institución donde se había llevado a cabo en el año 2003, lo que facilitó la implementación del mismo.

Se relevaron todos los pacientes mayores de 12 años que concurren y fueron a asistidos en salas de urgencia del hospital público durante una semana en el mes de octubre del 2005, exceptuando las consultas obstétricas. En la provincia de La Rioja se relevaron un total de **376 encuestas**.

Instrumento

El instrumento aplicado fue el cuestionario estandarizado del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (SIDUC) “Encuesta a pacientes en salas de Emergencia“, con algunos ajustes realizados en variables que poseen especificidad en la Argentina. Se realizaron pequeños ajustes luego de la experiencia en el año 2003.

El cuestionario fue respondido prioritariamente por el paciente. Si el mismo no estaba en condiciones de responder las preguntas, se recurría a un amigo o pariente presente o acompañante para registrar la información sociodemográfica y motivos del ingreso. La información sobre la asociación entre la consulta médica y el consumo de alguna sustancia fue brindada exclusivamente por el médico.

Respecto de la información referida al consumo de sustancias psicoactivas, en primer lugar, respondió el paciente, pero de haber síntomas claros y evidentes de la presencia de alguna sustancia que fuera negada por el paciente, la respuesta positiva fue dada por el médico.

Las variables relevadas en el estudio fueron:

- 1) Edad
- 2) Sexo
- 3) Nivel Educativo
- 4) Situación Conyugal
- 5) Situación Laboral
- 6) Ocupación
- 7) Estado en que llegó el paciente
- 8) Diagnóstico presuntivo
- 9) Motivo del Ingreso
- 10) Consumo de drogas en las últimas 6 horas según el paciente y/o la impresión clínica del médico (alcohol, marihuana, solventes e inhalables, alucinógenos, heroína, opio o morfina, cocaína, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas, anticolinérgicos, antidepresivos, pasta base, cristales, flunitracepan, crack, éxtasis, ketamina y otras drogas.)
- 11) Impresión clínica del médico sobre la relación entre la urgencia y el consumo de sustancias psicoactivas
- 12) Quién respondió sobre el consumo de drogas.

Trabajo de Campo

Se seleccionaron 21 coordinadores provinciales y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes recibieron una capacitación que se realizó de forma regional. La capacitación hizo hincapié en el manejo del cuestionario, distribución de las tareas en las salas de emergencia, selección y perfil de los encuestadores, posibles obstáculos y modos de resolverlos. Los coordinadores provinciales seleccionaron y capacitaron a los encuestadores de acuerdo a los perfiles definidos y fueron el nexo entre el Director del hospital, los profesionales de la guardia y el OAD.

Trabajaron un promedio de cuatro encuestadores por hospital, el perfil de los mismos fue necesariamente agentes de salud (profesionales, enfermeros, estudiantes). En todos los casos la respuesta de las autoridades fue positiva así como la colaboración brindada por el cuerpo médico y de enfermería.

El trabajo de campo se realizó durante la semana del 15 al 21 de octubre del 2005, durante las 24 horas del día. El equipo de investigaciones del OAD realizó una tarea de seguimiento y monitoreo.

IV RESULTADOS


En un primer lugar, se presenta una descripción de los casos encuestados, que en el total del país fueron 11.892 pacientes, teniendo en cuenta variables sociodemográficas y variables relacionadas a la consulta.

En un segundo lugar, se realiza el análisis de la relación entre la consulta y el consumo de sustancias psicoactivas, según las variables de interés.

1) Descripción de los pacientes encuestados

Variables de distribución de la muestra

Gráfico 1: Cantidad de pacientes encuestados en el hospital de la provincia de La Rioja en relación al total de la muestra.



En la provincia de La Rioja se encuestó un 3% de la muestra total del país, es decir 376 pacientes realizaron una consulta en la sala de emergencia de la provincia durante el lapso de aplicación de la encuesta.

Cuadro 1: Cantidad de pacientes encuestados por días de la semana. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Días de la semana	Cantidad de pacientes	%
Sábado 15	61	16,2
Domingo 16	56	14,9
Lunes 17	52	13,8
Martes 18	54	14,4
Miércoles 19	47	12,5
Jueves 20	52	13,8
Viernes 21	54	14,4
Total	376	100,0

La concurrencia de pacientes es levemente homogénea por día de la semana, cada día se realiza entre el 12% y el 16% de las consultas realizadas; el día que se registran más consultas es el sábado, con un 16,2%.

Se considera importante reagrupar las consultas según ocurrieran durante el fin de semana o entre semana, para lo cual, se considera “fin de semana” desde el viernes a las 20:00 horas hasta el lunes a las 8:00 horas, el resto es “entre semana”.

Cuadro 2: Cantidad de pacientes encuestados según entre semana / fin de semana. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Día de la semana	Cantidad de pacientes	%
Entre Semana	229	60,9
Fin de Semana	147	39,1
Total	376	100,0

En el cuadro 2 se observa que el 39,1% de las consultas son realizadas durante el fin de semana, porcentaje importante si se tiene en cuenta que abarca sólo 2 días y medio del total de la semana

Variables sociodemográficas

En este apartado se analizan las consultas realizadas en relación con determinadas variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel educativo y variables laborales).

Cuadro 3: Cantidad de pacientes encuestados según sexo. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Sexo	Cantidad de pacientes	%
Varones	216	57,4
Mujeres	160	42,6
Total	376	100,0

Al observar la cantidad de pacientes encuestados según la variable sexo, se pone de manifiesto que hay una proporción mayor de varones.

Cuadro 4: Cantidad de pacientes encuestados según grupos de edad. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Grupos de edad	Cantidad de pacientes	%	% acumulado
Entre 12 – 15 años	25	6,6	6,6
Entre 16 - 20 años	75	20,0	26,6
Entre 21 - 25 años	59	15,7	42,3
Entre 26 - 30 años	55	14,6	56,9
Entre 31 - 40 años	79	21,1	78,0
Entre 41 - 50 años	43	11,4	89,4
51 o más años	40	10,6	100,0
Total*	376	100,0	-

Más de la mitad de los pacientes (56,9%) atendidos durante la semana de estudio tiene entre 12 y 30 años. El promedio de edad de los pacientes atendidos en la sala de emergencia de la provincia de La Rioja es de 31 años.

Cuadro 5: Cantidad de pacientes encuestados según nivel de instrucción. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Nivel de instrucción	Cantidad de pacientes	%	% acumulado
Sin instrucción	9	2,5	2,5
Primaria incompleta	24	6,8	9,3
Primaria completa	65	18,3	27,6
Secundaria incompleta	116	32,7	60,3
Secundaria completa	103	29,0	89,3
Terciaria / universitaria incompleta	27	7,6	96,9
Terciaria / universitaria completa	11	3,1	100,0
Total*	355	100,0	-

*21 casos sin información

Analizando la totalidad de los pacientes que acudieron a la salas de emergencia del hospital de la provincia de La Rioja observamos una distribución heterogénea. En este sentido, el 80% de los pacientes declararon que su último nivel de instrucción se ubicaba entre la primaria completa y la secundaria completa. Por el contrario, sólo el 3,1% declaro haber finalizado estudios terciarios o universitarios.

Cuadro 6: Cantidad de pacientes encuestados según situación conyugal. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Situación Conyugal	Cantidad de pacientes	%
Soltero	196	53,8
Casado, Unido, Juntado	135	37,1
Divorciado, Separado, Viudo	33	9,1
Total*	364	100,0

*12 casos sin información

La mitad de los pacientes encuestados (53,8%) son solteros. En segundo lugar se ubican aquellos que se están casados, unidos o juntados; por último, con sólo un 9,1% se ubicaban los pacientes que estaban divorciados, separados o viudos cuando realizaron la consulta en la sala de emergencia.

Cuadro 7: Cantidad de pacientes encuestados según situación laboral. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Situación Laboral	Cantidad de pacientes	%
Trabaja a tiempo completo	78	21,8
Trabaja a tiempo parcial	74	20,7
Trabaja esporádicamente	26	7,3
Está desempleado	17	4,8
Estudiante	60	16,8
No trabaja	61	17,1
Ama de casa	26	7,3
Jubilado – pensionado	15	4,2
Total*	357	100,0

*19 casos sin información

Casi la mitad de los pacientes (49,8%) trabaja y un 4,8% se encuentra desocupado. El resto, puede considerarse inactivo económicamente, es decir, es ama de casa, estudiante, jubilado o no trabaja y no busca empleo, información que se muestra en el cuadro 8.

Cuadro 8: Cantidad de pacientes encuestados según condición de actividad. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Condición de actividad	Cantidad de pacientes	%
Activos	195	55
Inactivos	162	45
Total	357	100

*19 casos sin información

Cuadro 9: Cantidad de pacientes encuestados según ocupación (Base: total de activos). Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Ocupación	Cantidad de pacientes	%
Profesionales / empresarios	4	2,3
Técnicos / Comerciantes	11	6,2
Trabajadores administrativos	51	28,9
Pequeños comerciantes	3	1,7
Artisanos / trabajadores independientes con oficio	10	5,6
Operarios / obreros calificados	38	21,5
Peones / Aprendices	23	13,0
Servicio doméstico / vendedores ambulantes	13	7,3
Personal subalterno de las fuerzas de seguridad	5	2,8
Planes / subsidios de desempleo	19	10,7
Total*	177	100,0

*18 casos sin información

Dentro del universo de los pacientes que están trabajando, el 21,5% realiza tareas de calificación operativa, el 28,9% trabajos administrativos, y un 23,1% realiza tareas sin calificación (peones, servicio doméstico y vendedores ambulantes). Un 10,7% recibe algún subsidio por desempleo y sólo un 8,5% son profesionales, empresarios, técnicos o comerciantes.

Variables relacionadas a la consulta

En este apartado se presentan los perfiles de los pacientes de las salas de emergencia del hospital de la provincia de La Rioja según aquellas variables relacionadas a la consulta realizada.

Cuadro 10: Cantidad de pacientes encuestados según estado en el cual llegaron a la guardia. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Estado en que llegó el paciente	Cantidad de pacientes	%
Consciente	354	94,9
Inconsciente	9	2,4
Conmoción cerebral / obnubilados	10	2,7
Total*	373	100,0

*3 casos sin información

La mayoría de los pacientes, el 94,9%, llegó consciente a la sala de emergencia. En este sentido, sólo un 5,1% resto llegó inconsciente u obnubilado.

Cuadro 11: Cantidad de pacientes encuestados según motivo de ingreso a la guardia. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Situación Laboral	Cantidad de pacientes	%
Accidente de tránsito	59	15,8
Accidente de trabajo	11	2,9
Accidente común o casero	63	17,0
Situación de violencia	27	7,2
Intento de suicidio	6	1,6
Sobredosis	2	0,5
Síndrome de abstinencia	2	0,5
Motivo médico general	203	54,5
Total*	373	100,0

*6 casos sin información

La mitad de los pacientes (54,5%) ingresaron a la emergencia por motivos médicos generales (enfermedades en general), un 35,7% lo hizo por accidentes (de tránsito, de trabajo o común o casero). Por su parte el 7,2% de los pacientes atendidos en las salas de emergencia del hospital de la provincia de La Rioja ingresaron por motivos relacionados a situaciones de violencia.

Variables relacionadas al consumo

El cuestionario indagó sobre el consumo de sustancias psicoactivas en las últimas 6 horas anteriores al ingreso a la sala de emergencia. Los resultados de dicha indagación se presentan a continuación.

Cuadro 12: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en las últimas 6 horas anteriores al ingreso. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Sustancias Psicoactivas	Cantidad de pacientes	%
Alcohol	57	15,2
Marihuana	8	2,1
Solventes o inhalables	3	0,8
Psicofármacos* sin prescripción	11	2,9
Otras drogas	12	3,2

*Tranquilizantes, sedantes y antidepresivos

La sustancia de mayor consumo es el alcohol, consumido por el 15,2% de los pacientes. La prevalencia de consumo de otras drogas, de psicofármacos utilizados sin prescripción médica y de marihuana se ubica entre el 2% y el 3%.

Cuadro 13: Distribución de los pacientes según quién respondió sobre consumo. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Quién respondió sobre consumo	Cantidad de pacientes	%
El paciente	188	50,0
El médico	88	23,4
El paciente y el médico	99	26,3
Sin información	1	0,3
Total	376	100,0

En la mitad de los casos fue el paciente quien informó sobre el consumo de sustancias; para la otra mitad la información la dio, en proporciones similares, o bien el médico o tanto el paciente como el médico.

Cuadro 14: Impresión clínica del médico sobre la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y la consulta. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Impresión clínica médico	Cantidad de pacientes	%
Relacionado con el consumo de sustancias	44	11,7
Sin relación con el consumo de sustancias	315	83,8
Sin datos	17	4,5
Total	376	100,0

Del total de las consultas registradas en el hospital de la provincia de La Rioja (376), el 11,7% estuvieron relacionadas con el consumo de sustancias, según la impresión clínica del médico.

2. Análisis de la relación entre el consumo de sustancias y la consulta de emergencia

A continuación se presentan los datos sobre la relación entre las consultas y el consumo de sustancias ocurridas en el hospital de la provincia de La Rioja.

Cuadro 15: Impresión clínica del médico sobre la relación entre el consumo y la consulta de emergencia según sexo. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Sexo	Impresión clínica del médico		Total
	Relacionado con consumo	Sin relación con Consumo+	
Varones	17,1	82,9	100,0
Mujeres	4,4	95,6	100,0
Total	11,7	88,3	100,0

+ Incluye los casos "Sin datos"

Considerando las consultas relacionadas con el consumo y el corte poblacional por sexo, observamos que es significativamente mayor la consulta asociada al consumo entre los varones.

Cuadro 16: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según impresión clínica del médico sobre la relación entre el consumo y la consulta de emergencia. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Sustancias Psicoactivas	Impresión clínica médico		Prevalencia Total
	Relacionado con consumo	Sin relación con Consumo+	
Alcohol	88,6	5,4	15,2
Marihuana	18,2		2,1
Solventes o inhalables	6,8		0,8
Psicofármacos* sin prescripción	11,4	1,8	2,9

+ Incluye los casos "Sin datos" - *Tranquilizantes, sedantes y antidepresivos

La presencia del alcohol en las consultas relacionadas al consumo de droga es del 88,6%, indicando, una vez más, la importancia de esta sustancia en los patrones de consumo de la población. En segundo lugar se ubica la presencia de marihuana, con un 18,2% y en tercer lugar los psicofármacos utilizados sin prescripción médica con el 11,4%. Finalmente la presencia de solventes e inhalables es de 6,8%.

Cuadro 17: Día de la consulta según la Impresión clínica del médico sobre la relación entre el consumo y la consulta de emergencia. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Día de la consulta	Impresión clínica del médico		Total
	Relacionado con consumo	Sin relación con Consumo+	
Entre Semana	5,7	94,3	100,0
Fin de Semana	21,1	78,9	100,0
Total	11,7	88,3	100,0

+ Incluye los casos "Sin datos"

En el cuadro 17 se observa que durante el fin de semana ocurren en mayor proporción los episodios de emergencia que tienen relación con el consumo de sustancias, siendo la diferencia de 15,4 puntos porcentuales.

Cuadro 18: Distribución porcentual de pacientes **con consumo de alcohol**, según motivo de ingreso. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Motivo del ingreso de los pacientes con consumo de alcohol	Cantidad de pacientes	%
Accidente de tránsito	15	26,3
Accidente común o casero	11	19,3
Situación de violencia	13	22,8
Intento de suicidio	5	8,8
Otro motivo médico	10	17,5
Síndrome de abstinencia	2	3,5
Sobredosis	1	1,8
Total	57	100,0

Del total de pacientes con consumo reciente de alcohol (últimas 6 horas anteriores al ingreso a la emergencia) y de los cuales se tiene información sobre el motivo de

ingreso, el 22,8% ingresó por alguna situación de violencia, el 26,3% por accidentes de tránsito y el 19,3% por causas relacionadas a accidentes comunes o caseros.

Cuadro 19: Diagnósticos presuntivos de los pacientes según la Impresión clínica del médico sobre la relación entre el consumo y la consulta de emergencia. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2005.

Sustancias Psicoactivas	Impresión clínica médico		Total
	Relacionado con consumo	Sin relación con Consumo+	
Enfermedades del aparato cardiovascular	3,7	96,3	100,0
Enfermedades del aparato respiratorio	4,3	95,7	100,0
Enfermedades del aparato digestivo	1,7	98,3	100,0
Enfermedades psiquiátricas	60,0	40,0	100,0
Enfermedades de la piel y faneras	5,9	94,1	100,0
Enfermedades del aparato locomotor	2,1	97,9	100,0
Traumatismos-politraumatismos-heridas	23,9	76,1	100,0
Hematología-alergias no especificadas	10,0	90,0	100,0
Problemas quirúrgicos	12,5	87,5	100,0
Intoxicaciones	100,0		100,0

+ Incluye los casos "Sin datos"

Clasificados los diagnósticos presuntivos definidos por los médicos en cada consulta según patologías por órganos y sistemas, según muestra el cuadro anterior, se observa que la totalidad de las consultas por intoxicaciones, en la provincia de La Rioja, se debieron al consumo de sustancias psicoactivas. Se destaca también que el 60,0% de las enfermedades psiquiátricas atendidas en la guardia y el 23,9% de los traumatismos, tuvieron relación con el consumo de alguna droga.


Estos datos sobre la relación entre diagnóstico y consumo de sustancias psicoactivas son interesantes como indicadores del impacto específico en la salud de los pacientes

y en el impacto desde la perspectiva del costo económico y de recursos que el tratamiento de cada patología requiere.

3. Análisis comparativo con el Primer Estudio del año 2003

En octubre del año 2003 la SEDRONAR realizó el Primer Estudio Nacional sobre la relación entre la consulta de emergencia y el consumo de sustancias psicoactivas. Se utilizó igual metodología que en el actual estudio, tanto en lo referente al cuestionario, selección de hospitales públicos y abordaje de campo.

Gráfico 2: Porcentaje de consultas relacionadas al consumo de sustancias. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2003 y 2005.



Los datos del gráfico anterior indican que en el año 2005 se registro un porcentaje mayor de consultas relacionadas con el consumo de drogas. En este sentido, el porcentaje del año 2005 supera en 8,5 puntos porcentuales al del año 2003.

Cuadro 20: Porcentajes de consultas relacionadas al consumo de sustancias, según sexo. Hospital de la Provincia de La Rioja. 2003 - 2005.

Sexo	% de consultas relacionadas al consumo de sustancias	
	2003	2005
Varones	6,5	17,1
Mujeres		4,4
Total	3,2	11,7

Analizando el porcentaje de consultas realizadas según la variable sexo observamos que en ambos estudios, los porcentajes mayores se encuentran en los varones; por otra parte y acorde al gráfico 2, los porcentajes de asociación en ambos sexos son

levemente superiores en el año 2005. Cabe destacar que en el año 2003 no se registraron, en la provincia de La Rioja, consultas asociadas al consumo de sustancias en las mujeres, tendencia que se revierte para el año 2005.

V CONCLUSIONES

Este estudio al igual que el realizado en el año 2003, intenta explorar la magnitud de la asociación entre la consulta de emergencia y el consumo de alguna sustancia psicoactiva y conocer aspectos sociodemográficos, motivos de la consulta y estado en el cual llega el paciente en los casos vinculados al consumo.

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

- Del total de las consultas registradas en la provincia de La Rioja (376), el 11,7% estuvieron relacionadas con el consumo de sustancias según la impresión clínica del médico.
- Las consultas asociadas al consumo de alguna sustancia, son realizadas en mayor medida por varones.
- Durante los fines de semana ocurren la mayor cantidad de consultas asociadas al consumo, el 21,1% del total de las registradas en el fin de semana frente al 5,7% de las registradas durante la semana.
- La sustancia que tiene mayor prevalencia de consumo en las últimas 6 horas anteriores al ingreso a la guardia es el alcohol, con un 88,6%; Estos datos estarían indicando, una vez más, la importancia de esta sustancia en los patrones de consumo de la población. En segundo lugar se ubica la prevalencia de marihuana (18,2%). El resto de las sustancias presentan prevalencias entre el 2% y el 7%.
- Las consultas que tuvieron asociación con el consumo de alcohol, ingresaron principalmente por accidentes (de tránsito o caseros) y situaciones de violencia.