



Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2009

Informe Final de Resultados Provincia de Río Negro

**Área de Investigaciones
Enero 2011**

SEDRONAR

Secretario de Estado: Dr. José R. Granero

DIRECCIÓN NACIONAL DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS

Coordinador: Diego Alvarez Rivero

AREA DE INVESTIGACIONES

Coordinadora y Dirección del estudio: Graciela Ahumada

Investigadora: Alejandra Cuasnicú

PROYECTO ONUDD

Coordinación: Gustavo Segnana

INDICE

Introducción

Objetivos

Trabajo de campo

I. Metodología

- Instrumento
- Diseño muestral
- Descripción de la muestra

II. Resultados Generales

- **Prevalencia de vida**
 - Prevalencia de vida según sexo e intervalos de confianza
 - Prevalencia de vida según tramos de edad
- **Prevalencia de año**
 - Prevalencia de año según sexo e intervalos de confianza
 - Prevalencia de año según tramos de edad
- **Prevalencia de mes**
 - Prevalencia de mes según sexo e intervalos de confianza
 - Prevalencia de mes según tramos de edad

III. Consumo actual de bebidas alcohólicas

- Frecuencia de consumo
- Consumo riesgoso o abusivo

IV. Consumo actual de tabaco

V. Edad de inicio en el consumo

VI. Incidencia anual

VII. Intensidad y abuso del uso de drogas ilícitas

VIII. Consumo de bebidas energizantes

IX. Factores de riesgo y protección

- Dimensión personal
- Dimensión escolar
- Dimensión familiar
- Entorno social
- Asociación entre consumo de alcohol y tabaco y drogas ilícitas

X. Cursos de prevención e información

- Consumo y percepción sobre el nivel de información
- Recepción de cursos de prevención

XI. Tendencia 2001 – 2005 – 2007 – 2009

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través de su Observatorio Argentino de Drogas (OAD), realizó a mediados del año 2009 la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, sobre consumo de sustancias psicoactivas y factores de riesgo y protección asociados.

Este estudio forma parte del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, con el apoyo financiero y técnico de Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Observatorio Interamericano de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Los países participantes, en reuniones técnicas y de coordinación realizadas, consensuaron los aspectos metodológicos del estudio, definiendo un cuestionario base estandarizado, criterios de selección de muestra y modalidades de abordaje en campo. De esta manera, se garantiza la comparabilidad de los datos producidos a nivel regional.

El estudio informa sobre la magnitud del consumo de alcohol, tabaco, psicofármacos usados sin prescripción médica (tranquilizantes y estimulantes), solventes o inhalables, marihuana, cocaínas (clorhidrato y pasta base), heroína y otras drogas ilegales; a partir de un cuestionario autoaplicado. También indagó sobre factores de riesgo y protección, abuso de bebidas alcohólicas y sobre la percepción de los estudiantes acerca de sus condiciones de vida y de su entorno, información que se constituye en un avance en el conocimiento de esta problemática necesario para el diseño de políticas de prevención y asistencia necesarias.

La encuesta se realizó sobre una muestra representativa de los alumnos de 8º, 10º y 12º año de cursado que se corresponden por lo general a los alumnos de 13, 15 y 17 años de todo el país, que están cursando los años 1º, 3º y 5º del Régimen educativo tradicional o Nivel Medio; 1º y 3º del Polimodal y 8º de EGB3. El diseño muestral permite obtener datos representativos por Provincias.

En este informe se presentan las tasas de consumo, abuso de alcohol, tendencia y factores de riesgo correspondientes a los estudiantes de la Provincia de Río Negro. Se constituye en información necesaria para las autoridades provinciales y organismos de la provincia que se ocupan del problema del consumo de sustancias psicoactivas.

OBJETIVOS

La Cuarta Encuesta Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en Estudiantes del Nivel Medio 2009 definió los siguientes objetivos:

- Determinar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas de la población escolarizada de 13, 15 y 17 años de todo el país y de las 24 Provincias, según sexo, tramos de edad, año de cursado y tipo de colegio.
- Determinar la magnitud del abuso de alcohol en el consumo reciente o anual, según sexo y edad.
- Medir la evolución o tendencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar, considerando el Primer Estudio Nacional del año 2001, el Segundo del año 2005 y el Tercero del año 2007.
- Describir algunos factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar.
- Conocer las percepciones que los estudiantes tienen sobre sus niveles de información, recepción de cursos de prevención y su relación con el consumo de drogas.

TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo fue ejecutado, bajo la dirección del OAD, por la Universidad Nacional de Tres de Febrero – CINEA. Se realizó entre mediados de octubre y la primera semana de diciembre de 2009 simultáneamente en todo el país. La aplicación de la encuesta fue autoadministrada, voluntaria y anónima. Este constituye un elemento central dentro de las tareas de campo.

Para mayores detalles sobre el trabajo de campo ver el informe nacional.¹

¹ www.observatorio.gov.ar Estudios Nacionales

I. METODOLOGÍA

Instrumento

En el marco del trabajo conjunto del Proyecto Subregional, se acordaron variables básicas para la comparación de los datos, de todas maneras, el país agregó aquellas variables que consideró pertinentes en función de sus objetivos específicos. Como resultado de este proceso, el cuestionario definitivo quedó conformado por las siguientes dimensiones de análisis:

- Caracterización del colegio
- Características demográficas del alumno
- Situación conyugal de los padres
- Nivel de involucramiento de los padres
- Expectativas de los alumnos sobre su educación
- Rendimiento y comportamiento en la escuela
- Entorno de amigos
- Niveles de información y cursos de prevención
- Percepciones de la realidad socioeconómica de la familia y el entorno actual y a futuro
- Expectativas de los alumnos
- Percepción del riesgo del consumo de drogas
- Prevalencia de consumo de vida, año y mes
- Incidencia
- Edad de inicio
- Frecuencia de uso
- Abuso de alcohol
- Oferta y accesibilidad de drogas ilegales

El cuestionario se estructuró para que el alumno pueda responderlo sin dificultad, debido a la modalidad autoadministrada. La duración del llenado del mismo se calculó en un promedio de 30 minutos.

Diseño de la muestra

Como marco para la selección de la muestra se utilizó la base de establecimientos escolares proporcionada por el Ministerio de Educación de la Nación. Esta base contiene la totalidad de establecimientos educativos (niveles inicial, elemental, medio)

de todo el país. Además de la identificación del establecimiento, registra variables que fueron útiles para la selección de las escuelas: caracterización del establecimiento y matrícula por año.

Se diseñó una muestra probabilística, bietápica, estratificada en la primer etapa de selección. Las unidades de la primera etapa son los establecimientos educativos, que fueron seleccionados en cada estrato con probabilidad proporcional a la matrícula en los años objeto de estudio.

Las unidades de segunda etapa son las aulas. Las aulas se estratificaron según nivel y turno. Se seleccionó un mínimo de un aula por nivel y turno. Dentro de cada aula seleccionada se encuestan a todos los alumnos presentes.

Para garantizar datos a nivel de provincia, y en base a la experiencia de anteriores relevamientos, se asignó un tamaño mínimo de 22 escuelas a cada provincia, además de las escuelas autorepresentadas que pudieran corresponderle, aquellas que tienen 800 alumnos o más.

Una vez asignada la muestra por provincia, esta se distribuyó en forma proporcional a la cantidad de escuelas del estrato, pero con un mínimo de 1 escuela por estrato (público y privado), de esta manera, todos los estratos están representados en la muestra.

Las escuelas se seleccionaron dentro de cada estrato con probabilidad proporcional a su cantidad de alumnos en la franja de edad bajo estudio. Se aplicó un muestreo sistemático ordenando el estrato por departamento y localidad.

Para tener una muestra aproximadamente autoponderada (iguales factores de expansión) dentro de cada Provincia, se selecciona un número aproximadamente fijo de aulas por escuelas. La pauta de selección es un aula como mínimo por año/turno y un máximo de dos. Se diferencian las aulas por turno para poder presentar diferencias en el tipo de alumnado.


Para el cálculo de los factores de expansión se tuvo en cuenta la probabilidad de selección de la escuela y la probabilidad de selección del alumno dentro de la escuela.

Descripción de la muestra

En la Provincia de Río Negro se relevaron 3.555 estudiantes, es decir que un 4,3% del


total de la muestra nacional correspondió a estudiantes de esta provincia. Quedan representados un total de 24.788 estudiantes distribuidos en todo el territorio provincial.

Gráfico 1.1: Distribución de los estudiantes encuestados en la provincia de Río Negro, en relación con el total país. 2009.




A su vez, del total de los estudiantes relevados en la provincia, el 44,4% son varones y el 55% mujeres.

Gráfico 1.2: Distribución de los estudiantes de la Provincia de Río Negro según sexo. 2009.



En cuanto a la distribución por edad, el 27,5% tienen 14 años o menos, el 32,1%, 15 o 16 años y el 36%, 17 años o más.

Gráfico 1.3: Distribución de los estudiantes de la provincia de Río Negro según tramos de edad. 2009.



II. RESULTADOS GENERALES

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A NIVEL PROVINCIAL


A continuación se presentan los datos relativos a la provincia de Río Negro sobre consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, de los estudiantes del nivel medio, del octavo, décimo y duodécimo año de cursado.

Los datos sobre consumo se presentan por sexo y tramos de edad.

PREVALENCIA DE VIDA

La prevalencia de vida corresponde al consumo realizado por los estudiantes en algún momento de la vida.

Grafico 2.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Río Negro. 2009



Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, las prevalencias de vida más altas corresponden a alcohol (76,9%) y tabaco (55,6%).

Cuadro 2.1: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total		
	Varones	Mujeres	%	Intervalos de confianza	
Tabaco	52,7	58,2	55,6	53,8	57,5
Alcohol	75,9	77,7	76,9	75,2	78,5
Tranquilizantes sin pm	3,5	4,5	4,0	3,4	4,8
Estimulantes sin pm	3,6	3,2	3,3	2,7	4,1
Solventes / Inhalantes	4,9	2,8	3,8	3,1	4,6
Marihuana	23,0	15,0	18,7	17,3	20,1
Pasta base – Paco	3,3	1,5	2,3	1,8	3,0
Cocaína	7,6	3,7	5,5	4,7	6,4
Heroína	1,5	0,7	1,1	0,7	1,6
Opio	1,9	0,5	1,2	0,8	1,8
Morfina	2,0	1,6	1,9	1,4	2,5
Alucinógenos	2,8	1,6	2,2	1,7	2,7
Hashis	1,9	0,8	1,4	1,0	1,9
Crack	1,5	0,9	1,2	0,8	1,7
Extasis	3,7	2,3	3,0	2,4	3,7
Ketamina	1,6	0,6	1,2	0,8	1,7
Popper	1,4	0,6	1,0	0,7	1,6
Otras drogas	3,5	2,0	2,8	2,2	3,5
Alguna droga ilícita	25,6	17,1	21,0	19,5	22,5

El cuadro 2.1 indica que las sustancias legales (alcohol y tabaco) son las de mayor consumo. Más del 75% tomaron alguna bebida alcohólica, sin distinción por sexo y más del 55% de los estudiantes alguna vez en la vida fumaron, 52,7% de los varones y 58,2% de las mujeres.

Respecto del consumo de drogas ilícitas, el 21% de los estudiantes probaron alguna vez, siendo marihuana la de mayor prevalencia (18,7%), seguido por cocaína (5,5%), éxtasis (3%) y pasta base-paco (2,3%). El consumo de estas sustancias es superior para los varones.

Dentro del conjunto de los psicofármacos usados sin prescripción médica, los tranquilizantes ocupan el primer lugar, con una leve mayor prevalencia entre las mujeres, y de los varones en el uso de estimulantes.

El 3,8% de los estudiantes inhalaban alguna sustancia, siendo los varones quienes presentan las mayores tasas de consumo.

Cuadro 2.2: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	43,9	57,1	68,5
Alcohol	61,7	82,1	89,7
Tranquilizantes sin pm	3,0	3,4	5,7
Estimulantes sin pm	2,8	3,2	3,8
Solventes / Inhalantes	3,3	4,3	3,7
Marihuana	10,5	17,2	32,0
Pasta base – Paco	2,6	2,4	1,5
Cocaína	3,2	5,0	8,9
Heroína	1,7	0,8	0,7
Opio	1,0	1,3	1,1
Morfina	2,1	1,9	1,4
Alucinógenos	1,3	1,6	3,9
Hashis	0,7	1,5	1,9
Crack	1,8	0,6	1,1
Éxtasis	3,2	2,1	3,8
Ketamina	0,9	1,1	1,4
Popper	1,3	0,9	0,7
Otras drogas	2,2	2,9	3,2
Alguna droga ilícita	13,0	19,3	34,0


Los datos del cuadro 2.2 muestran que para las sustancias lícitas, psicofármacos sin prescripción médica, marihuana, cocaína, alucinógenos, hashis, ketamina y drogas ilícitas tomadas en su conjunto, el porcentaje de estudiantes que ha probado o consumido se incrementa con la edad, mientras el de los que han usado pasta base / paco, morfina, heroína o popper disminuye.

El consumo de vida según la edad de los estudiantes de solventes e inhalables y opio es superior entre los estudiantes de 15 y 16 años respecto de sus compañeros, el de crack, entre los más jóvenes, y el de éxtasis, entre los más grandes.

PREVALENCIA DE AÑO

La prevalencia de año corresponde a cualquier consumo realizado en el último año anterior a la encuesta y puede ser entendido como un **consumo reciente**. Es el mejor indicador sobre el consumo de drogas ilícitas y es por ello que cuando se presenta el análisis sobre factores de riesgo y protección, se realiza en función de la prevalencia del último año.

Grafico 2.2: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Río Negro. 2009.



Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, las prevalencias de consumo más altas corresponden a alcohol (63,1%) y en mucho menor medida a tabaco (36%). Un 15% de los estudiantes consumieron durante el último año alguna droga ilícita, siendo marihuana la de mayor prevalencia (13,9%) seguido por cocaína (3,1%). El uso sin prescripción médica de tranquilizantes alcanza al 1,8% de los estudiantes y el de estimulantes al 1,9%.

Cuadro 2.3: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total		
	Varones	Mujeres	%	Intervalos de confianza	
Tabaco	31,9	39,4	36,0	34,2	37,8
Alcohol	62,6	63,4	63,1	61,2	64,9
Tranquilizantes sin pm	1,6	1,9	1,8	1,3	2,3
Estimulantes sin pm	2,1	1,9	1,9	1,5	2,5
Solventes / Inhalantes	2,2	1,0	1,6	1,2	2,1
Marihuana	17,2	11,1	13,9	12,7	15,2
Pasta base - Paco	1,5	0,5	1,0	0,7	1,5
Cocaína	4,5	2,0	3,1	2,6	3,8
Éxtasis	2,1	1,3	1,7	1,2	2,2
Otras drogas	2,6	1,8	2,2	1,7	2,8
Alguna droga ilícita	18,7	11,9	15,0	13,8	16,3

En cuanto al consumo reciente por sexo, los varones presentan mayor prevalencia de todas las sustancias excepto alcohol, para la que no se observan diferencias por sexo, y tabaco y tranquilizantes sin prescripción médica, de consumo más alto entre las mujeres.

Cuadro 2.4: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.


Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	28,9	37,6	43,3
Alcohol	46,3	69,1	80,1
Tranquilizantes sin pm	1,0	1,8	2,0
Estimulantes sin pm	1,8	1,8	1,8
Solventes / Inhalantes	1,6	1,6	1,5
Marihuana	7,6	13,1	23,8
Pasta base - Paco	0,9	1,5	0,4
Cocaína	1,8	2,7	5,3
Éxtasis	1,9	1,1	2,0
Otras drogas	1,6	2,3	3,0
Alguna droga ilícita	8,4	14,3	24,8

El consumo reciente de sustancias lícitas (tabaco y alcohol), tranquilizantes sin prescripción médica, marihuana, cocaína y drogas ilícitas tomadas en conjunto aumenta con la edad de los estudiantes. Mientras que el consumo de estimulantes sin prescripción médica y solventes e inhalantes no se modifica con la edad, el de éxtasis es inferior entre los estudiantes de 15 y 16 años respecto a los otros dos grupos, y el de pasta base / paco, a la inversa, es más alto entre estos estudiantes.

PREVALENCIA DE MES

La prevalencia de mes corresponde a los estudiantes que manifestaron haber consumido las sustancias en los últimos 30 días, también se considera a este consumo como **consumo actual**.

Gráfico 2.3: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Río Negro. 2009



Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, el 47% de los estudiantes tomaron alcohol en el último mes, más de un 25% fumaron y la droga ilícita de mayor

consumo actual es marihuana (8,4%). El uso actual no prescripto de tranquilizantes y de estimulantes sin prescripción médica es de 1,2% y 1% respectivamente.

Cuadro 2.5: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total		
	Varones	Mujeres	%	Intervalos de confianza	
Tabaco	23,0	29,6	26,7	25,1	28,3
Alcohol	47,9	46,1	47,0	45,1	48,8
Tranquilizantes sin pm	1,3	1,1	1,2	0,8	1,7
Estimulantes sin pm	1,1	1,0	1,0	0,7	1,5
Solventes / Inhalantes	1,3	0,7	1,0	0,7	1,5
Marihuana	11,1	6,2	8,4	7,5	9,5
Pasta base - Paco	0,5	0,2	0,4	0,2	0,8
Cocaína	2,6	1,0	1,8	1,4	2,3
Éxtasis	1,0	0,5	0,8	0,5	1,2
Otras drogas	1,2	1,1	1,2	0,8	1,8
Alguna droga ilícita	12,5	6,8	9,4	8,4	10,5

Los varones tienen mayor consumo actual de todas las sustancias ilícitas. El uso de psicofármacos sin prescripción médica y alcohol no registran diferencias por sexo, y el de tabaco es superior entre las estudiantes mujeres.

Cuadro 2.6: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	21,5	26,0	34,0
Alcohol	29,0	52,2	65,5
Tranquilizantes sin pm	1,0	1,0	1,1
Estimulantes sin pm	0,7	1,1	1,0
Solventes / Inhalantes	1,1	1,0	0,7
Marihuana	3,9	8,1	15,0
Pasta base - Paco	0,4	0,5	0,2
Cocaína	1,3	1,3	2,8
Éxtasis	1,0	0,6	0,8
Otras drogas	1,0	1,1	1,6
Alguna droga ilícita	5,3	8,8	15,6

El consumo actual de sustancias lícitas y drogas ilícitas en conjunto, aumenta con la edad de los estudiantes, mientras el de solventes e inhalantes se comporta a la inversa. Por otro lado, el uso actual estimulantes sin prescripción médica, y pasta base / paco registran las mayores tasas entre los estudiantes de 15 y 16 años, el de cocaína, entre los de 17 años y más y el de éxtasis, entre los más jóvenes. Por último, el uso actual de tranquilizantes sin prescripción médica no se modifica con la edad de los estudiantes.


III. CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El consumo de alcohol en el país en los últimos años se ha generalizado en todas las franjas etarias y resulta particularmente riesgoso en los grupos más jóvenes². Es la sustancia psicoactiva de mayor consumo, que se encuentra fuertemente asociada al consumo de drogas ilícitas, tanto marihuana como cocaína.

Por ser una sustancia de curso legal, acompañada de una fuerte campaña publicitaria, e incorporada históricamente en el patrón alimentario de la región, resulta de particular importancia identificar con mayor precisión el perfil de consumo que presentan los adolescentes.

En este sentido se les preguntó a los estudiantes, cuántas veces habían consumido más alcohol de la cuenta y se habían emborrachado en el último mes, información que se presenta analizada por sexo y por tramos de edad. También se indaga a los estudiantes que tomaron alcohol, sobre cuántas veces lo hicieron en magnitudes de 5 tragos o más en una misma ocasión o salida, como indicador de abuso.


Gráfico 3.1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en el último mes según sexo. Provincia de Río Negro. 2009.



Sobre el total de estudiantes que declaran consumo en el último mes, el 32,4% reconoce haberse emborrachado o haber tomado más de la cuenta. Entre los varones, esta situación alcanza al 35,6% y entre las mujeres al 29,6%.


² Tercer Estudio Nacional en población de 12 a 65 años. Argentina 2006. Observatorio Argentino de Drogas. SEDRONAR

Gráfico 3.2: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en el último mes según tramos de edad. Provincia de Río Negro. 2009.




Los episodios de borrachera o intoxicación durante el último mes se incrementan a medida que aumenta la edad de los estudiantes.

Gráfico 3.3: En las últimas dos semanas, cuántas veces has consumido 5 tragos o más en una misma ocasión según sexo. Provincia de Río Negro. 2009.



6 de cada 10 estudiantes declaran haber consumido 5 tragos o más en una misma ocasión al menos una vez durante los últimos quince días, con mayor relevancia entre los varones que entre las mujeres.

Gráfico 3.4: En las últimas dos semanas, cuántas veces has consumido 5 tragos o más en una misma ocasión según tramos de edad. Provincia de Río Negro. 2009.



De acuerdo al gráfico anterior, no se observan importantes diferencias de acuerdo a la edad de los estudiantes en relación que el haber consumido 5 tragos o más en una misma ocasión.


Otro indicador que permite analizar el abuso de alcohol es la escala DSM IV³. A partir de preguntas sobre cuántas veces el estudiante ha tenido algún problema serio en la casa o en la escuela a causa del alcohol, ha puesto en riesgo su propia integridad física, ha hecho algo que pudiera causarle problemas con la ley o con la autoridad pública o ha tenido algún problema con la familia y los amigos –todo por causa del consumo de bebidas alcohólicas-. Se considera un caso de abuso el haber pasado al menos por alguna de estas situaciones dos veces o más durante el último año.

Como se observa en el gráfico siguiente, más del 20% de los estudiantes que consumieron alcohol el último año lo han hecho en forma abusiva, en el sentido de generar problemas para su propia integridad física o afectar su relación con el entorno.

Los varones son más propensos que las mujeres a pasar por estas situaciones.


³ DSMIV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. 1995. Masson S.A

Gráfico 3.5: Porcentaje de estudiantes con abuso de alcohol (DSMIV) según sexo. Provincia de Río Negro. 2009



El porcentaje de estudiantes que presenta un consumo de bebidas alcohólicas que le genera problemas en su entorno familiar y social aumenta con la edad.

Gráfico 3.6: Porcentaje de estudiantes con abuso de alcohol (DSMIV) según tramos de edad. Provincia de Río Negro. 2009




IV. CONSUMO ACTUAL DE TABACO

Para analizar la intensidad del consumo de tabaco se utilizan dos indicadores. La cantidad de días que fumaron en el último mes y la cantidad de cigarrillos que fumaron por día en igual periodo de tiempo.

Los estudiantes que fuman actualmente, en promedio lo hacen 17 días al mes, más las mujeres que los varones.

El gráfico anterior muestra que si bien alrededor del 35% de los estudiantes fuman menos de 10 días al mes (lo que puede pensarse como consumo de fin de semana), una proporción similar lo hace todos los días, más entre las mujeres.


Gráfico 4.1: Cantidad de días que fumaron en el último mes según sexo. Provincia de Río Negro. 2009



A medida que aumenta la edad de los alumnos, mayor cantidad de días fuman en promedio, ya que los de 14 años o menos lo hacen 15 días, los de 15 y 16 años, 17, y los de 17 años o más, 19 días.


El gráfico siguiente lo muestra, ya que puede observarse como la proporción de fumadores que consume menos de 10 días disminuye con la edad, mientras que el porcentaje que fuma todos los días, aumenta.

Gráfico 4.2: Cantidad de días que fumaron en el último mes según tramos de edad. Provincia de Río Negro. 2009



En promedio, los estudiantes de ambos sexos fuman 5 cigarrillos por día, y, cómo se observa en el gráfico, el mayor porcentaje se observa en los que fuman uno o dos cigarrillos por día, aunque debe resaltarse que alrededor de un 5% de los fumadores, declara consumir 20 cigarrillos o más diarios.


Gráfico 4.3: Cantidad de cigarrillos fumados por día en el último mes según sexo. Provincia de Río Negro. 2009



Fuman en promedio 4 cigarrillos por día los de hasta 14 años, 6, los de 15 y 16 años y 5 los de 17 años y más.

El cuadro siguiente muestra que la proporción de los estudiantes que han fumado solo 1 cigarrillo por día decrece a medida que los estudiantes son mayores, aunque la de aquellos que fuman 20 o más no varía de acuerdo a la edad.

Gráfico 4.4: Cantidad de cigarrillos fumados por día en el último mes según tramos de edad. Provincia de Río Negro. 2009



V. EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO

Cuando no se analiza por sexo, las sustancias lícitas (tabaco y alcohol), solventes e inhalantes y pasta base / paco son las que tienen un inicio en el consumo más precoz, a la edad de 13 años en promedio, mientras que las de inicio más tardío son marihuana y cocaína, a los 15 años. Los estudiantes de Río Negro comienzan a consumir psicofármacos sin prescripción médica y éxtasis a la edad media de 14 años.

Varones y mujeres se inician en el consumo a la misma edad promedio, excepto en el de estimulantes sin prescripción médica, solventes e inhalables y éxtasis, en cuyo caso la población estudiantil masculina es más precoz.

Cuadro 5.1: Indicadores estadísticos de la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas		Sexo		Total
		Varones	Mujeres	
Tabaco	Media	13	13	13
	Mediana	13	13	13
	Desvío Estándar	2	2	2
Alcohol	Media	13	13	13
	Mediana	13	14	13
	Desvío Estándar	2	2	2
Tranquilizantes sin pm	Media	14	14	14
	Mediana	14	14	14
	Desvío Estándar	3	2	3
Estimulantes sin pm	Media	13	14	14
	Mediana	14	14	14
	Desvío Estándar	3	2	2
Solventes / Inhalantes	Media	13	14	13
	Mediana	13	14	13
	Desvío Estándar	2	2	2
Marihuana	Media	15	15	15
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	2	2
Pasta base – Paco	Media	13	13	13
	Mediana	13	13	13
	Desvío Estándar	2	2	2
Cocaína	Media	15	15	15
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	2	2
Éxtasis	Media	14	15	14
	Mediana	14	15	14
	Desvío Estándar	2	2	2

VI. INCIDENCIA ANUAL

La tasa de incidencia anual indica el porcentaje de nuevos consumidores en el último año sobre el total de la población en riesgo. Esta medida indica un aspecto importante del problema al identificar la celeridad que presenta el consumo en una población determinada.

La tasa de incidencia del uso de drogas resulta de la división del número de personas que empezaron a usar una sustancia durante el último año y el número de personas que corren el riesgo de consumirla por primera vez. La “población en riesgo” es la población total bajo estudio menos aquellos que ya han usado drogas antes del último año, es decir, aquellos que no la habían consumido al inicio del periodo.

Cuadro 6.1: Incidencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
Tabaco	1.519 21,8	2.567 30,5	4.121 26,5
Alcohol	3.057 51,1	3.771 52,8	6.915 52,2
Tranquilizantes sin pm	145 1,3	254 1,9	399 1,6
Estimulantes sin pm	198 1,8	270 2,0	468 1,9
Solventes / Inhalantes	197 1,8	194 1,5	391 1,6
Marihuana	1.139 11,5	1.002 8,0	2.150 9,5
Pasta base – Paco	98 0,9	90 0,7	188 0,8
Cocaína	390 3,6	242 1,8	637 2,6
Éxtasis	184 1,7	173 1,3	357 1,5
Otras drogas	272 2,5	217 1,6	497 2,0
Alguna droga ilícita	1.618 14,5	1.304 9,7	2.939 11,9

* Las incidencias por sexo no suman las incidencias totales debido a los casos sin respuesta en la variable sexo.

Del mismo modo que se observó respecto de la prevalencia, la tasa de incidencia mayor es la de alcohol, con un 52,2%, lo que equivale a más de 6.900 estudiantes, con similar proporción entre los varones y entre las mujeres.

En segundo lugar, la incidencia de año de tabaco es de un 26,5%, superior entre las mujeres. Si se analiza la cantidad de estudiantes que comenzaron a fumar durante el último año, estos son más de 4.100.

Analizando al interior de las drogas ilícitas, la tasa de incidencia de marihuana es la más elevada, 9,5%, (11,5% entre los varones y 8% entre las mujeres). En total, ingresaron al consumo de marihuana en el último año 2.150 estudiantes.

Los nuevos consumidores de éxtasis, cocaína y pasta base / paco, son más varones, con tasas de incidencia superiores a las de las mujeres. Se estima que 357 estudiantes consumieron por primera vez éxtasis en el último año, 637 cocaína, y 188 pasta base / paco.

Respecto de los psicofármacos sin prescripción médica, las mujeres se han iniciado en mayor proporción durante el último año. Los nuevos consumidores son principalmente de estimulantes (1,9%), alrededor de 468 estudiantes, mientras se han iniciado en el uso de tranquilizantes 399 estudiantes (1,6%).

Cuadro 6.2: Incidencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15 – 16	17 o más
Tabaco	1.595 24,3	1.364 27,3	880 28,1
Alcohol	2.450 40,5	2.521 60,9	1.453 63,9
Tranquilizantes sin pm	82 1,0	135 1,7	135 2,1
Estimulantes sin pm	183 2,1	97 1,2	123 1,9
Solventes / Inhalantes	152 1,8	100 1,2	91 1,4
Marihuana	613 7,2	697 9,2	753 14,2
Pasta base – Paco	85 1,0	61 0,8	16 0,2
Cocaína	173 2,0	157 2,0	249 4,0
Éxtasis	173 2,0	60 0,7	91 1,4
Otras drogas	164 1,9	155 1,9	136 2,1
Alguna droga ilícita	797 9,1	943 11,5	1.034 15,7

* Las incidencias por edad no suman las incidencias totales debido a los casos sin respuesta en la variable edad.

En proporción el ingreso en el consumo de sustancias lícitas (tabaco y alcohol), tranquilizantes sin prescripción médica, marihuana y drogas ilícitas tomadas en conjunto se incrementa con la edad de los estudiantes, mientras en el de pasta base / paco, se observa la tendencia contraria.

En cuanto al uso de estimulantes sin prescripción médica, solventes e inhalables y éxtasis, es entre los estudiantes de hasta 14 años que se registra mayor ingreso al consumo.

Por último, la mayor proporción de nuevos consumidores de cocaína se observa entre los estudiantes de 17 años y más.

VII. INTENSIDAD Y ABUSO DEL USO DE DROGAS ILÍCITAS

El daño que el uso de las drogas ilícitas produce en la salud está relacionado con la intensidad del consumo, ya que el uso más frecuente y en mayor cantidad se podría asociar a signos y síntomas correspondientes a estados de adicción.

Para analizar la intensidad del consumo, se utilizan los siguientes indicadores: Entre los usuarios recientes o del último año de cada sustancia, se indaga la frecuencia de uso, y entre los usuarios actuales, o del último mes, la cantidad de días del mes en que se consumió. Ambos se presentan por sexo y edad de los estudiantes.

Asimismo, dentro de este capítulo se analiza la escala de abuso DSMIV⁴ para los usuarios de marihuana del último año, que permite estimar la magnitud del abuso o consumo de riesgo, definido a partir de disfuncionalidades sociales asociadas al consumo.

Intensidad en el uso de sustancias ilícitas para usuarios recientes

La intensidad del uso de drogas ilícitas en usuarios recientes refiere al grado de habitualidad que ha adquirido el consumo en los adolescentes que han utilizado cada una de las sustancias durante el último año, es decir, permite observar en qué medida el consumo es de tipo experimental (una sola vez), ocasional (algunas veces) o frecuente (semanal / diario).

En el cuadro siguiente se observa más de un 20% de usuarios frecuentes.

Cuadro 7.1: Intensidad del uso de sustancias en estudiantes con consumo reciente según tipo de sustancia ilícita. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009

Sustancias psicoactivas	Intensidad del uso		
	Experimental	Ocasional	Frecuente
Solventes/inhalantes	25,4	51,8	22,8
Marihuana	19,3	49,7	27,2
Pasta base – Paco	27,9	49,1	23,0
Cocaína	20,7	55,7	22,5
Éxtasis	26,1	47,6	25,1
Otras drogas	23,5	53,5	17,9

*Se omite la columna de los estudiantes que no responden

Excepto en solventes e inhalantes, los varones muestran mayor tendencia al consumo frecuente que sus compañeras.

⁴ DSMIV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. 1995. Masson S.A.

Cuadro 7.2: Intensidad del uso de sustancias en estudiantes con consumo reciente según tipo de sustancia ilícita y sexo. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009

Sustancias psicoactivas	Intensidad del uso					
	Varones			Mujeres		
	Experi- mental	Ocasional	Frecuente	Experimental	Ocasional	Frecuente
Solventes	30,2	49,0	20,8	18,4	59,6	22,0
Marihuana	18,2	48,2	31,1	21,0	51,4	22,1
Pasta base	27,5	48,5	24,0	32,8	57,8	9,4
Cocaína	19,4	55,3	23,6	22,3	59,5	18,2
Éxtasis	11,8	50,2	35,8	46,5	46,5	7,0
Otras drogas	31,4	47,9	16,6	15,9	64,4	13,8

*Se omite la columna de los estudiantes que no responden

El mayor porcentaje de usuarios frecuentes de solventes, cocaína, éxtasis y otras drogas, se observa entre los estudiantes más jóvenes, mientras que el marihuana y pasta base / paco, se presenta entre los estudiantes de mayor edad.

Cuadro 7.3: Intensidad del uso de sustancias en estudiantes con consumo reciente según tipo de sustancia ilícita y tramos de edad. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009

Sustancias psicoactivas	Intensidad del uso								
	14 o menos			15 / 16			17 y más		
	Experi- mental	Oca- sional	Frec.	Experi- mental	Oca- sional	Frec.	Experi- mental	Oca- sional	Frec.
Solventes	30,3	35,9	33,8	36,2	52,3	11,5	10,3	81,4	8,2
Marihuana	22,7	44,3	27,3	17,9	54,9	21,1	19,3	49,6	29,4
Pasta base	22,8	50,6	26,6	35,8	52,5	11,7	0,0	45,8	54,2
Cocaína	17,0	33,3	44,7	19,1	68,2	12,7	21,0	60,6	18,4
Éxtasis	26,9	29,9	43,1	27,2	63,0	9,8	19,4	60,4	16,4
Otras drogas	38,0	35,8	21,2	23,3	60,3	15,9	13,8	66,7	10,3


*Se omite la columna de los estudiantes que no responden

Abuso de marihuana

Para medir el abuso de marihuana se utiliza la escala DSMIV. A partir de preguntas sobre cuántas veces el estudiante ha tenido algún problema serio en la casa o en la escuela a causa del consumo de marihuana, ha puesto en riesgo su propia integridad física, ha hecho algo que pudiera causarle problemas con la ley o con la autoridad pública o ha tenido algún problema con la familia y los amigos, se construye una escala que considera abuso el haber pasado al menos por alguna de estas situaciones dos veces o más durante el último año.


Como se observa en el gráfico siguiente, dos de cada diez de los estudiantes que consumieron marihuana el último año, lo han hecho en forma abusiva, en el sentido de generar problemas para su propia integridad física o afectar su relación con el entorno. Los varones son más propensos que las mujeres a pasar por estas situaciones.

Gráfico 7.1: Porcentaje de estudiantes que consumieron marihuana durante el último año y con signos de abuso (DSMIV) según sexo. Provincia de Río Negro. 2009



El porcentaje de estudiantes que pasa por estas situaciones es más alto entre los estudiantes de 15 y 16 años, aunque para los tres grupos supera el 15% de los consumidores recientes de marihuana.

Gráfico 7.2: Porcentaje de estudiantes que consumieron marihuana durante el último año y con signos de abuso (DSMIV) según tramos de edad. Provincia de Río Negro. 2009



VIII. CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES

Las bebidas energizantes son bebidas sin alcohol de venta libre que producen un efecto estimulante y están compuestas por cafeína, vitaminas y otras sustancias naturales orgánicas que eliminan la sensación de agotamiento, y que por contener altas dosis de cafeína no pueden beberse de manera ilimitada y pueden producir dependencia. Si bien estas bebidas incluyen en su composición glucosa y otros azúcares que proporcionan energía al cuerpo (excepto las versiones dietéticas), no eliminan realmente la fatiga muscular ni el agotamiento en general, solamente inhiben temporalmente estas sensaciones, por lo tanto es normal una sensación de decaimiento una vez que acaba su efecto en el organismo. El riesgo potencial del consumo de este tipo de bebidas se ve incrementado por el uso concomitante con otras sustancias como es el caso del alcohol.

De acuerdo al cuadro siguiente, más de la mitad de los estudiantes han consumido durante el último año bebidas energizantes, y tres de cada diez lo hicieron durante el último mes, tanto entre los varones como en las mujeres.

Cuadro 8.1: Prevalencia de vida, año y mes de bebidas energizantes. Población escolar nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Prevalencia de bebidas energizantes	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
Vida	61,5	58,7	59,8
Año	54,3	51,7	52,7
Mes	32,3	31,0	31,5


El consumo de bebidas energizantes aumenta con la edad de los estudiantes, partiendo de prevalencias superiores al 23% aún entre los estudiantes más chicos.

Cuadro 8.2: Prevalencia de vida, año y mes de bebidas energizantes según tramos de edad. Población escolar nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Prevalencia de bebidas energizantes	Tramos de edad		
	14 o menos	15 - 16	17 o más
Vida	50,8	63,1	69,5
Año	41,6	56,6	63,8
Mes	23,9	35,4	38,0


Los gráficos que se presentan a continuación demuestran que en su mayoría los usuarios de bebidas energizantes las combinan con alcohol, lo que aumenta su efecto y las hace particularmente riesgosas. 66% de los estudiantes que consumieron estas bebidas durante el último mes, lo hicieron en forma combinada con alcohol, comportamiento más usual en las mujeres.

Gráfico 8.1: Porcentaje de estudiantes que consumió bebidas energizantes durante el último mes y lo hicieron en forma combinada con alcohol según sexo. Provincia de Río Negro. 2009



El uso combinado aumenta con la edad, en especial a partir de los 15 años, la gran mayoría de los estudiantes de 17 años y más con consumo actual de bebidas energizantes lo hace en forma combinada con alcohol (77,8%). De todos modos, resulta preocupante que cerca de la mitad de los alumnos de hasta 14 años que han consumido estas bebidas lo han hecho en forma combinada.

Gráfico 8.2: Porcentaje de estudiantes que consumió bebidas energizantes durante el último mes y lo hicieron en forma combinada con alcohol según tramos de edad. Provincia de Río Negro. 2009



IX. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN

En los capítulos anteriores se presentaron las tasas que indican la magnitud del consumo de sustancias lícitas e ilícitas, tanto a nivel global, reciente y actual, distinguiendo por sexo y tramos de edad de los estudiantes.

Considerando que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno social, condicionado por aspectos económicos, culturales e individuales, en un momento histórico determinado, es necesario indagar sobre aquellos aspectos que permitan identificar y comprobar las asociaciones que el consumo presenta en relación a diferentes condiciones, ya sean individuales, comunitarias, escolares y familiares.

En la búsqueda de las causas que determinan el consumo, se denominan *factores de riesgo* a aquellas características sociales, culturales y/o individuales que en conjunto, en un momento determinado, incrementan las condiciones de vulnerabilidad de la persona para el consumo de drogas. Por otra parte, los *factores de protección* se refieren a los estímulos y situaciones originadas en el individuo, el grupo o el medio social que al estar presente en un específico periodo de la vida, determinan una menor vulnerabilidad en relación con el uso de drogas⁵.

En el marco de esta problemática y con el objetivo de presentar datos que fortalezcan su conocimiento, se presentan las diferentes variables de riesgo y protección que fueron indagadas en el cuestionario y su relación con las tasas de consumo del último año.

A modo de organizar la información, se proponen cinco dimensiones analíticas: personal, escolar, familiar, de entorno o comunitario y asociación entre el consumo de drogas legales e ilegales, ámbitos que contienen las variables que dan cuenta de los factores de riesgo y protección.

Entonces, al interior de la dimensión personal, se presentan las tasas de consumo en relación a:

- Disponibilidad de dinero
- Expectativas a mediano y largo plazo
- Percepción del riesgo del uso de drogas

⁵ José Francisco Vallejos Saldarriaga: "Consumo de drogas y Factores de riesgo y protección en escolares de Educación Secundaria". DEVIDA. 2001.

- Curiosidad y probabilidad de consumo de drogas
- Si trabaja además de estudiar

En la dimensión escolar, se analizan datos objetivos y percepciones de los estudiantes respecto al ámbito escolar:

- Fracaso escolar
- Problemas de comportamiento en la escuela
- Ausentismo
- Percepción sobre la exigencia académica
- Percepción sobre la exigencia disciplinaria

La dimensión familiar, considera:

- Nivel de atención o de involucramiento de los padres
- Consumo de drogas en el ámbito familiar

Las variables de la dimensión comunitaria o del entorno, están relacionadas al grupo de pares y a la facilidad de acceso y oferta directa de drogas:

- Presión del grupo de pares frente al consumo
- Tenencia de amigos que se emborrachan o consumen drogas ilícitas
- Oferta directa de drogas y lugares de oferta
- Accesibilidad

Y por último, el consumo de alcohol y tabaco como factores de riesgo.

1) Dimensión personal

Diferentes son los factores de riesgo de tipo individual que favorecen el consumo de drogas. Estos factores están ligados a condiciones psicológicas y conductuales, tales como trastornos de conducta y problemas de salud mental, depresión, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, conductas antisociales, alienación y rebeldía, agresividad, actitudes favorables al consumo de droga y búsqueda de sensaciones.

Por otro lado, los factores de protección se vinculan a la autoestima, a habilidades sociales para la integración, habilidades para adaptarse a circunstancias cambiantes, aspiraciones de futuro y resiliencia.

En esta dimensión denominada “personal” –lo cual no implica que se la desligue de los condicionantes sociales en las cuales el estudiante se encuentra inserto- se han incluido un conjunto de variables incorporadas en la encuesta y que refieren a la disponibilidad de dinero, si el estudiante trabaja o no, las expectativas que los estudiantes tienen a un corto y mediano plazo, la percepción sobre el riesgo que presenta el consumo de drogas y la curiosidad y propensión a experimentar el uso de drogas.

Disponibilidad de dinero y ocupación

Según se observa en el cuadro 9.1, si bien no se observa una relación directa, en los extremos la disponibilidad de dinero aparece como factor de riesgo en el consumo de cualquier sustancia, excepto tranquilizantes sin prescripción médica. No hay que desestimar que el comportamiento de esta variable esté influenciada por la edad, es decir, a mayor edad, mayor disponibilidad de dinero.

Es oportuno no asociar este indicador con nivel socioeconómico del estudiante, sino con la posibilidad de disponer de dinero, que si bien tiene que ver con alguna condición socioeconómica del hogar, indica una condición favorable del estudiante para satisfacer gustos y necesidades.

Cuadro 9.1: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según disponibilidad mensual de dinero. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Disponibilidad mensual de dinero para gastos personales					
	Nada	Menos de \$30	Entre \$30 y \$60	Entre \$61 y \$90	Entre \$91 y \$120	Más de \$120
Tabaco	27,7	30,0	39,4	39,5	36,5	40,4
Alcohol	49,8	53,2	64,5	69,9	66,1	71,1
Tranquilizantes sin pm	3,7	1,5	1,2	1,4	1,7	2,3
Estimulantes sin pm	2,1	0,8	1,8	2,6	1,1	3,4
Solventes / Inhalantes	2,5	1,2	1,1	1,2	0,4	3,3
Marihuana	13,7	8,4	13,2	15,7	13,5	19,9
Pasta base – Paco	0,4	0,8	1,0	1,0	0,3	1,8
Cocaína	2,2	1,8	2,3	3,7	1,2	6,6
Éxtasis	1,0	1,2	2,3	1,2	0,4	2,9
Otras drogas	2,0	1,5	1,9	2,0	1,2	4,2
Alguna droga ilícita	15,1	9,5	14,9	16,5	14,1	20,8

El consumo de sustancias, en especial las ilícitas, está asociado a la condición de actividad del estudiante, ya que en todos los casos las tasas son mayores para los que trabajan. Se debe considerar que el factor edad es una variable interviniente en esta relación.

Cuadro 9.2: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según condición de actividad del estudiante. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Trabaja	
	Si	No
Tabaco	47,9	34,2
Alcohol	75,5	61,5
Tranquilizantes sin pm	5,1	1,2
Estimulantes sin pm	4,8	1,5
Solventes / Inhalantes	4,0	1,2
Marihuana	22,7	12,5
Pasta base – Paco	2,4	0,7
Cocaína	6,7	2,5
Éxtasis	5,1	1,1
Otras drogas	5,6	1,7
Alguna droga ilícita	23,6	13,6

Expectativas a mediano y largo plazo

Las expectativas que los estudiantes tienen respecto a su futuro, tanto personal como familiar y del entorno, se configuran como un factor de riesgo si las mismas son bajas o negativas y por el contrario, serán un factor de protección cuando son altas o positivas.

La encuesta indagó sobre diferentes expectativas. A corto plazo, se les preguntó a los estudiantes sobre cuáles son sus perspectivas de terminar el colegio secundario y de ingresar a la universidad; y a mediano plazo, como evalúan las posibilidades de realizar proyectos personales. Por otro lado, y también como una mirada de futuro, se les preguntó sobre cómo creen que serán las condiciones socioeconómicas de sus familias y de su entorno social.

Los cuadros que siguen, presentan las tasas de consumo del último año según cada una de estas expectativas. Por ser variables de tipo ordinal, las respuestas indican los extremos en los cuales queda expresado una situación de riesgo y otra de protección frente al consumo de drogas.

Cuadro 9.3: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cuán probable vos pensás que vas a terminar el último año del secundario?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Probabilidad de terminar el secundario			
	Muy probable	Algo Probable	Poco probable / imposible	No se
Tabaco	33,2	35,2	56,4	43,9
Alcohol	64,3	61,2	67,4	57,6
Tranquilizantes sin pm	1,7	1,5	0,9	3,5
Estimulantes sin pm	1,7	1,5	4,2	3,5
Solventes / Inhalantes	1,1	1,1	6,7	2,8
Marihuana	12,5	13,5	26,4	16,1
Pasta base – Paco	0,6	1,1	3,2	2,0
Cocaína	2,7	2,8	6,8	4,8
Éxtasis	1,2	1,3	5,2	3,3
Otras drogas	1,7	2,3	5,9	3,2
Alguna droga ilícita	13,3	14,6	30,3	17,7

En primer lugar, es oportuno aclarar que el 76,9% de los estudiantes manifiesta que tiene muchas ganas de terminar el colegio secundario y un 14,6%, que tiene “algo de ganas”. Y en cuanto a la distribución según sus expectativas, el 61,4% manifestó que es muy probable que termine el secundario, mientras que un 5,5% dijo que es poco probable o imposible.

El cuadro anterior muestra que la baja expectativa de poder terminar el colegio se asocia con el consumo de sustancias psicoactivas, ya que para aquellos que consideran poco probable o imposible hacerlo las tasas son superiores en todas las sustancias excepto tranquilizantes sin prescripción médica, y en especial para las drogas ilícitas.

Cuadro 9.4: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cuán probable vos pensás que vas a ingresar a la Universidad?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Probabilidad de ingresar a la universidad			
	Muy probable	Algo Probable	Poco probable / imposible	No se
Tabaco	31,5	36,5	42,4	40,0
Alcohol	63,7	62,9	67,9	57,7
Tranquilizantes sin pm	1,8	1,6	1,8	2,1
Estimulantes sin pm	1,9	1,9	1,9	2,2
Solventes / Inhalantes	0,5	1,4	3,6	2,7
Marihuana	11,4	14,0	20,1	13,5
Pasta base – Paco	0,4	0,7	1,6	2,4
Cocaína	2,3	2,7	5,1	4,2
Éxtasis	0,9	1,7	2,1	3,0
Otras drogas	1,5	2,3	3,0	3,0
Alguna droga ilícita	12,1	14,6	22,4	15,4

En cuanto al ingreso a la universidad, el 73,1% de los estudiantes tiene ganas de hacerlo, y el 67,7% cree que esto es probable o muy probable.

Las tasas de consumo son superiores en el grupo que considera poco probable o imposible continuar con estudios superiores, excepto en el caso del uso de psicofármacos sin prescripción médica, cuyo consumo no varía según las perspectivas de ingresar a la universidad.

Las expectativas a mediano plazo, bajo la consigna de cómo piensan determinadas situaciones en el “futuro”, fueron abordadas mediante tres preguntas, una que refiere a las posibilidades de realización de proyectos personales, la segunda sobre cómo creen los estudiantes que serán las condiciones socioeconómicas de su familia en el futuro y la tercera, sobre cómo piensan que serán las condiciones socioeconómicas de las familias de su entorno o localidad, apelando a una imagen de sociedad o comunidad.

El 58,1% de los estudiantes cree que son buenas las posibilidades de realizar en el futuro algún proyecto personal, el 22,1% considera que estas posibilidades son regulares o malas y el resto no sabe, es decir, que por falta de indicadores o por tenerlos con cierta confusión o inestabilidad, no tiene opinión sobre su futuro.

El cuadro siguiente muestra que, sin importantes diferencias, las mayores tasas se presentan en el grupo que tiene las más bajas expectativas hacia el futuro, excepto en el caso de pasta base / paco y éxtasis donde las perspectivas de desarrollo individual no inciden en los niveles de consumo.

Cuadro 9.5: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cómo pensás que serán en el futuro las posibilidades de que puedas realizar un proyecto personal?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cómo pensás que serán en el futuro las posibilidades de realizar un proyecto personal?		
	Buena	Regular / Mala	No se
Tabaco	33,9	38,6	39,4
Alcohol	63,3	67,5	58,0
Tranquilizantes sin pm	1,6	2,0	1,6
Estimulantes sin pm	1,5	2,6	2,1
Solventes / Inhalantes	1,3	2,0	1,9
Marihuana	13,1	15,7	14,0
Pasta base – Paco	0,9	0,9	1,3
Cocaína	2,9	3,5	3,7
Éxtasis	1,4	1,4	2,6
Otras drogas	2,0	3,0	1,9
Alguna droga ilícita	14,1	16,7	15,1

El 56,8% de los estudiantes piensa que en el futuro las condiciones socioeconómicas de sus familias serán buenas, el 27,9% cree que serán regulares o malas y el resto no puede hacer una apreciación. La valoración sobre la condiciones de vida de las familias remite directamente a las posibilidades que ellos mismos puedan tener para su realización, de hecho, un hogar con deficiencias económicas y sociales brinda menores posibilidades para el inicio o sostenimiento de proyectos personales.

El cuadro siguiente muestra que las mayores tasas se presentan en el grupo que tiene las más bajas expectativas perspectivas respecto al futuro familiar, excepto en el caso de tranquilizantes sin prescripción médica, pasta base / paco y éxtasis, en cuyo caso éste aspecto no incide en los niveles de consumo.

Cuadro 9.6: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas de tu familia?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas de tu familia?		
	Buena	Regular / Mala	No se
Tabaco	33,4	39,7	39,5
Alcohol	61,8	67,5	61,3
Tranquilizantes sin pm	1,7	1,6	1,7
Estimulantes sin pm	1,7	2,4	1,7
Solventes / Inhalantes	1,4	1,8	1,8
Marihuana	12,3	16,8	13,7
Pasta base – Paco	1,0	0,9	1,1
Cocaína	3,0	3,5	3,3
Éxtasis	1,5	1,6	2,6
Otras drogas	2,0	2,4	2,8
Alguna droga ilícita	13,3	18,3	14,9

La percepción a futuro sobre el bienestar social comunitario es positivo apenas para un 23,1% de los estudiantes, regular o malo para el 53,2% y el resto no sabe.

El menor optimismo observado en relación al entorno también se refleja en una relación menos directa entre estas expectativas y el consumo de sustancias psicoactivas. Si bien los optimistas consumen menos alcohol y tabaco, no se observa este tipo de asociación respecto a las restantes sustancias, ya sea porque consumen al mismo nivel los que tienen buenas y malas perspectivas, o inclusive porque los primeros presentan tasas más altas.

Cuadro 9.7: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas de las familias de tu localidad?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas en general de las familias de tu localidad?		
	Buena	Regular / Mala	No se
Tabaco	32,5	37,5	36,3
Alcohol	57,6	67,4	59,2
Tranquilizantes sin pm	1,6	1,6	2,0
Estimulantes sin pm	2,7	1,7	1,6
Solventes / Inhalantes	2,7	1,2	1,1
Marihuana	13,2	14,9	12,1
Pasta base – Paco	1,2	0,9	1,1
Cocaína	3,3	3,2	2,9
Éxtasis	2,3	1,1	2,2
Otras drogas	2,3	2,2	2,2
Alguna droga ilícita	14,8	15,7	13,1

Percepción de riesgo

La percepción de riesgo frente al consumo es una variable o factor que en sus extremos se configura como un factor de protección (gran riesgo) o un factor de riesgo o vulnerabilidad (ningún riesgo y riesgo leve).

Es por ello que el cuestionario indagó sobre esta percepción por parte de los alumnos, haciendo mención no solamente a las distintas sustancias, sino también a diferentes frecuencias en sus usos. Incluso, se ha diferenciado el uso de alguna vez del uso de una o dos veces, para poder captar la percepción frente a la experimentación.

De acuerdo al siguiente cuadro, todas las sustancias, tanto las legales como las ilícitas son consideradas de alto riesgo en su uso frecuente.

En cuanto al uso experimental, los estudiantes manifiestan una leve percepción de riesgo respecto a las sustancias lícitas (alcohol y tabaco), de leve a moderada en relación a los psicofármacos sin percepción médica, marihuana y cocaína.

Las sustancias que mayor percepción de gran riesgo tienen entre los estudiantes son pasta base o crack, inhalantes y éxtasis, aunque en los tres casos un porcentaje similar al que considera el consumo experimental u ocasional muy riesgoso lo considera de peligro leve o moderado, lo cual debe significar una alerta.

Otro dato de interés es que alrededor de un 20% de estudiantes no pueden evaluar el riesgo del consumo de estimulantes.

Cuadro 9.8: Distribución porcentual de los estudiantes según percepción de riesgo por sustancias y frecuencia de uso. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Cuál es el riesgo que corre una persona que...?	Percepción de riesgo*				
	Ninguno	Leve	Moderado	Grande	No sabe
Fuma cigarrillos alguna vez	17,8	46,4	19,8	9,9	5,4
Fuma cigarrillos frecuentemente	1,5	9,9	24,6	60,2	2,8
Tomar bebidas alcohólicas alguna vez	29,1	41,7	17,8	5,9	4,4
Toma bebidas alcohólicas frecuentemente	1,9	9,0	25,0	59,1	4,1
Se emborracha con bebidas alcohólicas	2,0	7,2	17,0	67,3	5,3
Prueba tranquilizantes una o dos veces	9,3	26,0	29,3	20,6	13,5
Toma tranquilizantes alguna vez	17,6	34,2	24,5	8,6	13,8
Toma tranquilizantes frecuentemente	1,8	7,3	18,1	58,8	12,5
Prueba estimulantes una o dos veces	9,9	27,7	26,6	12,2	21,7
Toma estimulantes alguna vez	13,9	28,8	23,8	10,4	21,3
Toma estimulantes frecuentemente	2,0	6,5	14,9	54,7	20,1
Prueba inhalables una o dos veces	5,0	25,6	29,5	22,0	15,7
Aspira inhalables alguna vez	6,7	20,2	29,9	27,1	14,2
Aspira inhalables frecuentemente	1,7	2,7	5,2	74,2	14,4
Prueba marihuana una o dos veces	21,7	36,1	21,8	13,6	5,3
Fuma marihuana alguna vez	22,6	35,4	24,5	9,7	6,0
Fuma marihuana frecuentemente	2,2	8,4	17,4	64,4	5,5
Prueba cocaína una o dos veces	7,5	34,7	32,3	15,9	7,6
Consume cocaína alguna vez	11,2	29,5	32,1	17,8	7,7
Consume cocaína frecuentemente	1,0	4,0	9,5	76,1	7,0
Prueba pasta base o crack una o dos veces	4,3	23,4	32,7	28,0	9,4
Consume pasta base o crack alguna vez	6,3	20,4	29,6	31,6	10,0
Consume pasta base o crack frecuentemente	1,5	3,4	6,6	76,2	9,9
Prueba éxtasis una o dos veces	6,5	25,5	30,5	21,9	13,6
Consume éxtasis alguna vez	8,0	22,0	29,3	24,3	14,2
Consume éxtasis frecuentemente	1,6	2,4	5,2	74,4	14,3

* Los porcentajes no suman cien por ciento por existir casos sin respuesta

La asociación entre percepción de riesgo y consumo son muy significativas en todas sustancias, especialmente las ilícitas, ya que se observa una importante diferencia entre las tasas de consumo según los estudiantes consideren que el consumo de esa sustancia es de ningún o de gran riesgo.

Cuadro 9.9: Prevalencia de año por sustancias según percepción de riesgo asociado a su consumo. Provincia de Río Negro. 2009.


Percepción de riesgo	Prevalencia según percepción	
	Ninguno	Grande
Fuma cigarrillos alguna vez	45,9	25,0
Fuma cigarrillos frecuentemente	51,5	32,5
Tomar bebidas alcohólicas alguna vez	74,0	50,9
Toma bebidas alcohólicas frecuentemente	66,0	61,7
Se emborracha con bebidas alcohólicas	73,3	63,1
Prueba tranquilizantes una o dos veces	4,2	1,9
Toma tranquilizantes alguna vez	3,5	0,4
Toma tranquilizantes frecuentemente	9,9	1,7
Prueba estimulantes una o dos veces	6,1	2,1
Toma estimulantes alguna vez	4,4	2,0
Toma estimulantes frecuentemente	13,6	1,6
Prueba inhalables una o dos veces	6,1	1,5
Aspira inhalables alguna vez	4,2	1,5
Aspira inhalables frecuentemente	4,8	1,6
Prueba marihuana una o dos veces	38,1	2,5
Fuma marihuana alguna vez	30,9	1,0
Fuma marihuana frecuentemente	47,0	7,2
Prueba cocaína una o dos veces	15,0	0,6
Consume cocaína alguna vez	5,7	1,7
Consume cocaína frecuentemente	16,2	2,4
Prueba pasta base o paco una o dos veces	9,3	0,0
Consume pasta base o paco alguna vez	5,4	0,2
Consume pasta base o paco frecuentemente	15,2	0,7
Prueba éxtasis una o dos veces	8,3	0,8
Consume éxtasis alguna vez	6,0	0,3
Consume éxtasis frecuentemente	15,0	1,0

Curiosidad y probabilidad de consumo de drogas

Otro factor de riesgo se asienta en la curiosidad por probar alguna droga ilegal y en la intención de hacerlo frente a la posibilidad de tener acceso u ocasión.


El 17,7% de los estudiantes manifiestan tener curiosidad de hacerlo, en una leve mayor proporción entre las mujeres.

Gráfico 9.1: Curiosidad de probar alguna droga ilegal ilícita según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.




La curiosidad de probar alguna droga ilícita aumenta con la edad.

Gráfico 9.2: Curiosidad de probar alguna droga ilícita según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.




Un 10,2% de estudiantes de tener la ocasión probarían una droga ilegal, lo que ocurre un poco más entre las mujeres, del mismo modo que la curiosidad.

Gráfico 9.3: Probaría de tener la ocasión alguna droga ilícita según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



Del mismo modo que la curiosidad, la intención de probar se incrementa levemente con la edad.

Gráfico 9.4: Probaría de tener la ocasión de alguna droga ilegal ilícita según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



2) Dimensión escolar

La dimensión escolar en estudiantes del nivel medio se configura como un espacio en donde juegan aspectos que se definen, de acuerdo a la experiencia internacional y nacional, en factores de protección y de riesgo frente al consumo de alcohol y drogas. Así, el bajo rendimiento académico, el bajo apego a la escuela, la conducta antisocial o bajo nivel de integración a la vida escolar y el tipo de escuela, suelen ser factores de riesgo.

Por el contrario, la escuela que presenta buenos estándares de calidad en exigencia académica y en normas de conducta, que brinda posibilidades para la implicación social, el cuidado y apoyo de profesores y un clima institucional positivo, se constituye en factor de protección.

En este apartado, se analizarán algunos factores de riesgo y protección del ámbito escolar y su asociación con el consumo reciente de alcohol y drogas.

Desempeño escolar

La encuesta indagó sobre el ámbito escolar de los estudiantes a partir de cinco preguntas sobre repitencia, problemas de comportamiento, ausentismo y percepción sobre el nivel de exigencia del colegio en términos académicos y disciplinarios.

En primer lugar, se presentan las tasas de consumo para cada pregunta o indicador y luego en relación al índice que hemos denominado de desempeño escolar construido a partir de los cinco indicadores anteriormente mencionados.

Un primer factor relacionado al desempeño escolar medido a través de los fracasos o no que los estudiantes tuvieron en su historia escolar, nos muestra que el consumo se presenta asociado a éste. Aquellos que repitieron al menos un año (el 37,6%) manifiestan haber consumido sustancias en el último año en mayor proporción que aquellos que nunca repitieron, excepto psicofármacos sin prescripción médica y solventes e inhalantes. En el caso del uso de esta última sustancia y de tranquilizantes sin prescripción médica, los que más consumen son los que repitieron dos o más años, respecto a sus compañeros no repitentes o que solo lo hicieron un año, mientras que el uso de estimulantes sin prescripción médica no varía según esta variable.

Cuadro 9.10: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según fracaso escolar. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Cuántos años repetiste durante tu cursado?		
	Ninguno	Uno	Dos o más
Tabaco	31,9	42,4	44,2
Alcohol	61,0	65,9	68,7
Tranquilizantes sin pm	1,5	1,4	4,4
Estimulantes sin pm	2,0	2,0	1,9
Solventes / Inhalantes	1,4	1,1	3,6
Marihuana	11,3	16,5	22,3
Pasta base – Paco	0,7	1,1	2,6
Cocaína	2,1	4,6	5,7
Éxtasis	1,2	1,8	4,0
Otras drogas	1,7	2,6	4,3
Alguna droga ilícita	12,0	18,2	24,4

Problemas de comportamiento

El 7,5% de los estudiantes tuvieron problemas frecuentes de comportamiento, y el 43,1%, algunas veces. Las tasas de consumo reciente son mayores entre estos estudiantes, en especial en el primer grupo.

Cuadro 9.11: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según problemas de comportamiento en el colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Has tenido problemas de comportamiento?		
	Frecuentemente	Pocas veces	Nunca
Tabaco	55,6	44,3	25,7
Alcohol	75,5	70,9	54,3
Tranquilizantes sin pm	4,7	2,0	1,2
Estimulantes sin pm	8,1	1,9	1,0
Solventes / Inhalantes	7,4	2,0	0,4
Marihuana	31,4	19,1	6,6
Pasta base – Paco	5,0	1,1	0,3
Cocaína	8,3	4,3	1,3
Éxtasis	5,0	2,3	0,6
Otras drogas	6,3	3,1	0,8
Alguna droga ilícita	33,4	20,4	7,5

Ausentismo

La mitad de los estudiantes han faltado con frecuencia al colegio, cualquiera sea el motivo. En este grupo de estudiantes el consumo de sustancias psicoactivas es mayor en relación a los que no faltaron con frecuencia al colegio, excepto de tranquilizantes sin prescripción médica, cuyo consumo es similar para ambos grupos de estudiantes.

Cuadro 9.12: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según faltas al colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Has faltado con frecuencia al colegio este año?	
	Si	No
Tabaco	42,7	29,4
Alcohol	68,5	58,0
Tranquilizantes sin pm	1,8	1,7
Estimulantes sin pm	2,7	1,2
Solventes / Inhalantes	2,3	0,9
Marihuana	18,5	9,1
Pasta base – Paco	1,4	0,6
Cocaína	4,5	1,8
Éxtasis	2,4	0,9
Otras drogas	3,4	1,1
Alguna droga ilícita	19,5	10,3

Percepciones sobre la exigencia en el colegio

La calidad de un ámbito escolar se relaciona, entre otros aspectos, con la exigencia académica que brinda el colegio y las normas de comportamiento o disciplina que

imparte. El estudio no fue diseñado para medir estos aspectos, pero sí se les preguntó a los alumnos sobre cuán exigente académicamente es el colegio y cuán estricto es en relación a la disciplina, desde su perspectiva.

El 57,3% de los estudiantes respondió que sus colegios son muy y bastante exigentes. Las tasas de consumo de todas las sustancias son inferiores en este grupo, respecto a los que respondieron que sus colegios poco o nada exigentes (el 9,7% de los estudiantes).

Cuadro 9.13: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según opinión sobre exigencia académica del colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Cuán exigente académicamente es tu colegio?			
	Mucho	Bastante	Algo	Poco / Nada
Tabaco	26,9	35,4	38,7	44,3
Alcohol	50,6	63,7	66,1	71,4
Tranquilizantes sin pm	2,6	1,2	1,5	3,9
Estimulantes sin pm	2,0	1,5	1,9	4,1
Solventes / Inhalantes	1,9	1,5	1,0	3,6
Marihuana	10,3	11,0	15,7	26,7
Pasta base – Paco	0,8	1,0	0,7	2,3
Cocaína	3,7	2,4	3,0	6,1
Éxtasis	2,7	0,6	1,6	4,5
Otras drogas	1,9	1,9	1,7	5,9
Alguna droga ilícita	11,3	12,3	16,5	28,3

El colegio es muy o bastante estricto para el 62,3% de los estudiantes, y poco o nada, para el 9,6%. Entre el primer grupo las tasas de consumo reciente son menores en relación con las de los estudiantes que asisten a colegios poco o nada rígidos.

Cuadro 9.14: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según opinión sobre nivel de exigencia en disciplina del colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.


Sustancias psicoactivas	Cuán exigente en disciplina es tu colegio?			
	Mucho	Bastante	Algo	Poco / Nada
Tabaco	34,3	32,6	39,7	43,9
Alcohol	56,9	61,4	67,0	74,6
Tranquilizantes sin pm	1,0	1,6	2,0	3,6
Estimulantes sin pm	1,8	1,5	1,7	4,8
Solventes / Inhalantes	1,2	1,7	1,2	3,6
Marihuana	10,8	11,0	15,9	27,9
Pasta base – Paco	0,5	1,3	0,8	1,5
Cocaína	2,3	2,6	2,8	8,3
Éxtasis	1,7	1,2	1,3	4,3
Otras drogas	1,4	2,1	1,8	6,2
Alguna droga ilícita	11,4	12,5	17,0	29,0

Índice de desempeño escolar

A partir de los indicadores anteriormente analizados se construye la escala o índice de desempeño escolar. El índice varía entre 0 y 9, donde el valor 0 indica la peor situación o peor desempeño escolar y 9 es el valor que indica la mejor performance. Este mejor desempeño significa que el estudiante no ha repetido, asiste a un colegio que considera exigente y estricto, no ha faltado con frecuencia, ni ha tenido problemas de comportamiento o disciplina.

De acuerdo al gráfico siguiente, el tránsito más exitoso por el sistema educativo disminuye el riesgo de consumo de sustancias legales e ilegales, así, los estudiantes de mejor desempeño tienen una tasa de consumo de drogas ilegales del 5,7% frente al 48,3% de los estudiantes con peor desempeño.

Gráfico 9.5: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según índice de desempeño escolar. Población escolar nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



3) Dimensión familiar

El ámbito familiar, principal ambiente de socialización de los adolescentes, se conforma como un espacio con capacidad de configurar personalidades y en este sentido, es un espacio en donde se desarrollan o promueven las capacidades personales y sociales de los individuos. Los adolescentes, precisamente por la etapa del ciclo vital en la cual se encuentran, mantienen un vínculo de tensión con los padres. Tensiones que juegan aspectos de cuidado, existencia de límites, acompañamientos, seguridad, posibilidades de realizar proyectos, etc.

Una familia se configura como un factor de riesgo cuando en la misma se promueven actitudes de consumo de drogas legales o ilegales y más aún cuando el consumo se encuentra presente por parte de padres o adultos, cuando hay baja supervisión sobre los adolescentes, cuando la historia familiar incita conductas antisociales, alta conflictividad intrafamiliar, abuso físico o psíquico, y de bajas expectativas para los niños en lo que hace a su desarrollo personal.

Por el contrario, espacios familiares de contención, con estándares claros de conducta, con altas expectativas parentales hacia sus hijos y una dinámica familiar positiva, serán factores de protección hacia el consumo de sustancias.

Nivel de atención de los padres

La encuesta indagó sobre el nivel de atención de los padres en relación a la vida de sus hijos desde la percepción de los estudiantes. Esta percepción es central en la comprensión de la importancia que tiene la cercanía de los padres y su asociación con el consumo de sustancias psicoactivas. Este aspecto se aborda a partir de una escala de actitud que se construye a través de siete preguntas que indagan sobre algunos comportamientos de los padres respecto de sus hijos. El índice varía entre 0 y 7, donde el valor 0 indica la peor situación o de no atención y cuidado por parte de los padres hacia sus hijos y 7 es el valor que indica la mejor situación.

Se presentan las tasas de consumo para cada pregunta o indicador de la escala y luego el índice y su relación con el consumo.

Una primera pregunta indagó sobre las veces que los padres desconocen el lugar en donde están sus hijos. El 30,7% de los estudiantes respondieron que nunca o a veces sus padres no saben en dónde se encuentran ellos.

Las prevalencias de consumo reciente de cualquier sustancia, en especial las ilícitas, son considerablemente menores entre los estudiantes que declaran un mayor cuidado de sus padres en relación a saber donde están.

Cuadro 9.15: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: "Después que salís del colegio o durante los fines de semana ¿Cuántas veces ocurre que tu mamá o tu papá no saben donde estás? Por un periodo de una hora o más". Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Cuántas veces saben dónde estoy		
	Nunca o casi nunca saben	A veces no saben	Siempre o casi siempre saben
Tabaco	57,8	48,0	30,1
Alcohol	73,7	77,5	57,0
Tranquilizantes sin pm	3,8	2,9	1,2
Estimulantes sin pm	7,0	2,8	1,3
Solventes / Inhalantes	7,9	2,5	0,8
Marihuana	36,6	24,1	8,6
Pasta base – Paco	6,7	1,2	0,5
Cocaína	12,4	4,2	2,1
Éxtasis	8,9	2,5	0,8
Otras drogas	9,2	4,2	1,0
Alguna droga ilícita	38,2	25,4	9,6

El cuidado por parte de los padres, visto desde el conocimiento que los mismos tienen respecto de los programas de TV que miran sus hijos, también se asocia al consumo, en especial para las sustancias ilícitas.

Un 23,8% de los estudiantes declararon que sus padres no conocen qué programación televisiva miran y en este grupo, el consumo de sustancias lícitas e ilícitas es mayor.

Cuadro 9.16: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: "En general, ¿alguno de tus padres se fija en los programas que ves en televisión?". Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Se fija o conoce los programas de TV?	
	Si	No
Tabaco	33,5	43,8
Alcohol	59,3	74,7
Tranquilizantes sin pm	1,4	3,0
Estimulantes sin pm	1,5	3,4
Solventes / Inhalantes	1,2	2,8
Marihuana	10,8	23,6
Pasta base – Paco	0,5	2,5
Cocaína	1,7	7,4
Éxtasis	1,0	3,8
Otras drogas	1,6	4,1
Alguna droga ilícita	11,5	25,9

El 22,3% de los estudiantes perciben que sus padres están poco o nada atentos respecto de lo que hacen en el colegio. Las tasas de consumo de todas las sustancias son superiores en este grupo de estudiantes.

Cuadro 9.17: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cuán atentos están tus padres (o alguno de ellos) respecto de lo que hacés en el colegio?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cuán atentos están respecto de lo que hago en el colegio	
	Mucho / Bastante	Poco / Nada
Tabaco	32,6	48,0
Alcohol	60,8	71,5
Tranquilizantes sin pm	1,6	2,4
Estimulantes sin pm	1,7	2,7
Solventes / Inhalantes	1,2	2,9
Marihuana	11,6	22,1
Pasta base – Paco	1,0	1,1
Cocaína	2,6	5,0
Éxtasis	1,3	2,9
Otras drogas	1,9	3,4
Alguna droga ilícita	12,6	23,4

Otra de las preguntas que forma parte del índice indagó sobre la cantidad de días en los cuales los estudiantes comparten la mesa (para desayunar, almorzar, cenar y / o merendar) con sus padres. El 71,8 % los estudiantes comparte todos los días la mesa con sus padres o alguno de ellos. Los estudiantes que comen todos los días en familia tienen, en general, menor nivel de consumo, aunque no se verifica una relación lineal que indique que a menor cantidad de días que los estudiantes comparten con sus padres en alguna comida, mayor consumo.

Cuadro 9.18: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “En una semana normal, ¿cuántos días se sientan a comer juntos, vos y tus padres (o alguno de ellos), en la misma mesa, para desayunar, almorzar, merendar o cenar?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias Psicoactivas	Cuántos días se sientan a comer juntos?			
	Ninguno	Uno a tres	Cuarto a seis	Todos los días
Tabaco	59,9	44,4	43,5	32,4
Alcohol	82,0	67,7	70,3	60,4
Tranquilizantes sin pm	1,8	2,6	2,1	1,6
Estimulantes sin pm	7,3	4,2	2,5	1,2
Solventes / Inhalantes	4,3	3,1	1,8	1,2
Marihuana	28,2	20,5	17,8	11,5
Pasta base – Paco	2,8	3,1	-	0,7
Cocaína	7,3	5,2	4,6	2,4
Éxtasis	8,4	3,0	1,9	1,1
Otras drogas	5,5	5,5	2,4	1,5
Alguna droga ilícita	30,0	22,4	18,3	12,6

El control sobre la hora de llegada a casa de los estudiantes cuando salen los fines de semana es un factor de protección y de riesgo, si este control no se da. El 28,5% de los estudiantes manifiesta que los padres no controlan el horario al que llegan por la noche los fines de semana, y en este grupo las tasas de consumo son más altas.

Cuadro 9.19: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “Durante los fines de semana, ¿tus padres (o alguno de ellos) te controlan a qué hora llegás a tu casa en la noche?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Te controlan a qué hora llegas?	
	SI	NO
Tabaco	33,7	41,7
Alcohol	59,0	73,9
Tranquilizantes sin pm	1,5	2,4
Estimulantes sin pm	1,7	2,7
Solventes / Inhalantes	1,3	2,3
Marihuana	10,7	21,9
Pasta base – Paco	0,7	1,9
Cocaína	2,1	5,7
Éxtasis	1,1	3,2
Otras drogas	1,4	4,3
Alguna droga ilícita	11,5	23,9

Casi del 87,2% de los estudiantes respondió que los padres les preguntan a dónde van cuando salen de la casa o durante los fines de semana. Si bien en este grupo el consumo de sustancias también existe, es menor respecto del grupo de estudiantes donde este control o cuidado por parte de los padres no ocurre.

Cuadro 9.20: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “Cuando salís de la casa en las tardes o en los fines de semana, ¿tus padres (o alguno de ellos) te preguntan y/o esperan que vos les digas a dónde vas?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	Te preguntan a dónde vas?	
	SI	NO
Tabaco	34,5	47,3
Alcohol	62,0	71,8
Tranquilizantes sin pm	1,4	4,4
Estimulantes sin pm	1,5	5,6
Solventes / Inhalantes	1,0	6,0
Marihuana	12,0	27,8
Pasta base – Paco	0,8	2,7
Cocaína	2,7	6,7
Éxtasis	1,2	5,3
Otras drogas	1,4	8,0
Alguna droga ilícita	13,1	29,6

El conocimiento de los padres de los amigos más cercanos de los estudiantes también opera como un factor de protección. El 15% de los estudiantes dijo que sus padres conocían poco o nada a sus amigos, y el consumo de sustancias es superior en este grupo.


Cuadro 9.21: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: "En general, ¿cuánto crees que tus padres (o algunos de ellos) conocen a tus amigos más cercanos?". Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cuánto conocen tus padres a tus amigos más cercanos?		
	Bastante	Más o menos	Poco / Nada
Tabaco	33,0	37,4	42,4
Alcohol	62,6	62,6	65,8
Tranquilizantes sin pm	1,6	1,7	2,5
Estimulantes sin pm	1,4	1,8	4,0
Solventes / Inhalantes	1,0	2,1	2,3
Marihuana	12,1	14,7	18,3
Pasta base – Paco	0,6	1,1	2,0
Cocaína	2,6	3,0	5,4
Éxtasis	0,8	1,6	4,5
Otras drogas	1,4	2,8	3,6
Alguna droga ilícita	13,1	15,9	19,7

En función de los indicadores anteriormente analizados se construye una escala a partir de su combinación.

Los estudiantes cuyos padres tienen -según esta escala-, actitudes de mayor atención y cuidado respecto de la vida de sus hijos, tienen una tasa de consumo de drogas ilegales del 5,8% frente al 39,5% de los hijos de padres que están en el punto más bajo de esta escala, es decir, que tienen actitudes de menor atención y cuidado. El siguiente gráfico muestra esta progresión del consumo de acuerdo a la escala.

Gráfico 9.6: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según índice de atención de los padres. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro.2009.




Consumo de drogas en el ámbito familiar

El 8% de los estudiantes dijo que alguno de sus hermanos u otra persona que vive en su casa consume actualmente alguna droga ilícita, el 75,7% contestó que no y el resto no sabe.

Los niveles de consumo reciente de alguna droga ilícita entre los estudiantes están asociados claramente a estas características del entorno. Según muestra el gráfico siguiente, el consumo es considerablemente mayor entre los estudiantes que declaran tener hermanos o personas en la casa que consumen actualmente.

Gráfico 9.7: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según el consumo actual de drogas ilícitas en la casa. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro.2009.



4) Dimensión comunitaria o Entorno social

El entorno social juega un rol significativo de riesgo o de protección para las personas en general y para los adolescentes escolarizados en particular. Los factores de riesgo y de protección que brindan el espacio familiar o escolar y las que tienen que ver con la personalidad del adolescente pueden ser potenciados o frenados por variables del entorno.

En la población bajo estudio, adolescentes escolarizados, el grupo de pares juega un rol importante, tanto si este grupo de pares presenta niveles de consumo como si alientan el consumo. El grupo de amigos es una instancia de socialización secundaria, que durante la adolescencia, adquiere un peso primordial en la conformación del individuo.

A continuación se presentan los datos de consumo en relación al grupo de pares y a la oferta y accesibilidad al consumo de droga.


Grupo de pares

Dos aspectos se analizan en relación al grupo de pares: la tenencia de amigos que fuman marihuana o consumen alcohol regularmente y la presión que el grupo ejercería frente al consumo de marihuana y de otras drogas ilícitas.

Sólo el 11,5% de los estudiantes no tiene amigos que tomen regularmente alguna bebida alcohólica, es decir, todos los fines de semana o más. El 28,3% dijo que menos de la mitad de sus amigos toma regularmente alcohol, el 16,2% que la mitad de sus amigos lo hace y el 31,9% dijo que todos o casi todos.

En el gráfico siguiente se observan las tasas de consumo actual o del último mes de alcohol de los estudiantes según la tenencia de amigos que consumen alcohol regularmente. A medida que es mayor el entorno de amigos que consume, mayor es la proporción de alumnos que toman alcohol actualmente.


Gráfico 9.8: Prevalencia de mes de consumo de bebidas alcohólicas según tenencia de amigos que consumen alcohol regularmente. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



El entorno de amigos que fuma marihuana presenta otros valores. El 41% dijo no tener amigos que consuman, el 23,3% dijo que menos de la mitad de sus amigos lo hace, el 7,9% tiene la mitad de amigos que fuma marihuana y un 5,6% dijo que todos o casi todos consumen.

La influencia del entorno también es muy fuerte en el caso de la marihuana, según se observa en el gráfico siguiente, que muestra las tasas de consumo reciente o del último año de marihuana en los estudiantes según su entorno de consumo.

Gráfico 9.9: Prevalencia de año de consumo de marihuana según tenencia de amigos que fuman marihuana. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.




Otro aspecto a analizar en relación al grupo de pares o de amigos, es la presión que el mismo ejercería frente a una situación de consumo. El cuestionario indagó sobre la percepción que tienen los estudiantes de las reacciones de su grupo de amigos si supieran que ellos fuman marihuana.

Las respuestas indican que el 56,3% piensa que el grupo desaprobaría el consumo y diría algo para que no lo hiciera, el 21,8%, cree que la mitad de sus amigos lo aprobaría, un 7,5% siente que sus amigos no le dirían nada, como una actitud de indiferencia frente al consumo y sólo un 2,3% piensa que lo alentarían para seguir consumiendo. El resto de los estudiantes no sabe cuál sería la reacción de sus amigos frente al consumo de marihuana.

De acuerdo al gráfico siguiente lo que digan los amigos en relación al consumo actual de marihuana no incide directamente en lo que hacen los estudiantes al respecto.

Gráfico 9.10: Prevalencia de año de consumo de marihuana según presión del grupo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



La presión para no consumir es un tanto superior cuando se trata de otras drogas que no son la marihuana, tales como cocaína, pasta base, éxtasis o ácidos. El 66% de los estudiantes piensa que este consumo sería desaprobado por los amigos más cercanos y que éstos dirían algo para impedirlo. Sólo un 1,6% piensa que este probable consumo sería aprobado. El 15,9% de los estudiantes cree que algunos lo aprobarían y otros no, y el 4,5% siente que la reacción sería de indiferencia.

Oferta directa de drogas

Así como la percepción de riesgo al consumo es una barrera subjetiva, la oferta se constituye como una barrera objetiva. Se estima que cuanto mayor sea la oferta, mayor será la probabilidad de consumo. De hecho, tabaco y bebidas alcohólicas, las sustancias de curso legal son aquellas que tienen las mayores tasas de consumo.


El 33,3% de los estudiantes han recibido oferta de marihuana ya sea para comprar o probar. Al 12,3% le ofrecieron cocaína, al 7,2% le ofertaron pasta base / paco y al 7,5% éxtasis.

Cuadro 9.22: Distribución porcentual de los estudiantes según oferta de drogas ilícitas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron?	Marihuana	Cocaína	Pasta base-paco	Éxtasis
Durante los últimos 30 días	15,4	3,5	1,9	2,1
Más de 1 mes, menos de 1 año	9,9	4,9	2,3	2,6
Hace más de 1 año	8,1	3,9	3,0	2,8
Nunca me han ofrecido	62,0	79,8	84,9	84,5
Desconocido	4,7	7,8	7,9	8,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

El gráfico siguiente muestra que la oferta de drogas opera como una barrera para el consumo. Entre los estudiantes que recibieron oferta directa de drogas para comprar o para consumir, el consumo es claramente superior.

Gráfico 9.11: Prevalencia de año de consumo según oferta de drogas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



Los lugares de oferta son principalmente fiestas o recitales tanto de marihuana como de otras drogas, el 13,4% de los estudiantes que recibieron oferta de marihuana y un 9,4% de los que recibieron oferta de otras drogas, dijeron que la misma ocurrió en el colegio, y el 11,8% de aquellos a los que se les ofreció marihuana y el 12,2% de los que recibieron oferta de otras drogas, en los alrededores del mismo.

Cuadro 9.23: Lugar de oferta de drogas ilegales. Estudiantes de nivel medio que recibieron oferta directa. Provincia de Río Negro. 2009.

Si te ofrecieron, en qué lugar te ofrecieron la última vez?	Marihuana*	Otra droga*
En mi casa	3,6	3,2
En mi colegio	13,4	9,4
En los alrededores de mi colegio	11,8	12,2
En una fiesta o recitales	32,4	31,5
En los alrededores de mi casa	10,6	11,3
Internet	2,5	2,7
Otro lugar	40,3	38,5

*Cada porcentaje es independiente entre si y está calculado sobre el total de estudiantes que tuvieron ofrecimiento de marihuana u otra droga

Accesibilidad

La accesibilidad y oferta de sustancias es la otra dimensión, que conjuntamente con los factores que determinan la demanda, explican la problemática del consumo de drogas. Se entiende que cuando la oferta es ilimitada y la accesibilidad resulta fácil, existe mayor probabilidad de que el consumo se efectivice.


En el cuestionario se les preguntó a los alumnos cuán fácil les resulta conseguir determinadas sustancias ilegales. Los resultados indican que para el 40,4% de los estudiantes es fácil conseguir marihuana; para el 18,6% es fácil conseguir clorhidrato de cocaína, para el 14,7% es fácil conseguir pasta base y para un 12,2%, éxtasis.

Cuadro 9.24: Distribución porcentual de los estudiantes según percepción de facilidad de acceso a drogas ilegales. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

¿Cuán fácil o difícil te sería conseguir?	Marihuana	Cocaína	Pasta base-paco	Éxtasis
Fácil	40,4	18,6	14,7	12,2
Difícil	9,0	18,4	14,6	14,8
No podría conseguir	11,3	17,5	22,6	21,4
No sabe / No contesta	39,3	45,6	48,1	51,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

La asociación entre accesibilidad y consumo se muestra en el gráfico siguiente, las mayores tasas de consumo se corresponden al grupo de alumnos que consideran que es fácil acceder a cada una de las sustancias.

Gráfico 9.12: Prevalencia de año de consumo según percepción de facilidad de acceso a drogas ilegales. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.




5) Consumo de alcohol y tabaco

El consumo de alcohol y tabaco en adolescentes es un factor de riesgo para el consumo de otras sustancias psicoactivas. La experiencia nacional e internacional indica que entre la población con consumo de sustancias lícitas, la probabilidad de consumo de sustancias ilícitas es mayor.

Los siguientes gráficos confirman esta hipótesis.


Entre los estudiantes que fumaron en el último año, el consumo de marihuana fue del 28,8%, mientras que entre los no fumadores, esta tasa es del 5,5%. Con una distancia menor, entre los fumadores, el consumo de cocaína es del 6,6% frente al 1,2% en el grupo de los no fumadores.

Gráfico 9.13: Prevalencia de año de consumo de marihuana y cocaína según fumen o no. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



Entre los estudiantes que tomaron alguna bebida alcohólica en el último año, el consumo de marihuana es del 20,8% frente al 2,1% del grupo de los que no bebieron. Y el consumo de cocaína es del 4,8% y 0,2% respectivamente.

Gráfico 9.14: Prevalencia de año de consumo de marihuana y cocaína según tomen alcohol o no. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.



X. CURSOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

Uno de los aspectos siempre en disputa acerca de los motivos del consumo de los adolescentes está ligado a la desinformación que los mismos tienen respecto de los daños que provoca el uso de drogas. Ya se analizó la percepción de gran riesgo y se observó que la misma es alta en relación al consumo frecuente y que el consumo de drogas ilícitas es menor entre los estudiantes que perciben que su consumo no conlleva ningún riesgo.

Por otra parte, el estudio indagó sobre el nivel de información que los estudiantes creen tener sobre los daños que ocasiona el consumo, sobre si han recibido cursos de prevención en el colegio y sobre las razones que ellos perciben acerca de los motivos del consumo de drogas en la gente en general. Estas variables, se presentan analizadas por sexo, edad y consumo asociado.

Cuadro 10.1: Distribución porcentual de los estudiantes según percepción de información según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Te sentís lo suficientemente informado sobre las consecuencias del consumo de drogas	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
Nada informado	5,2	2,5	3,7
Poco informado	22,7	30,3	26,9
Bien informado	65,7	62,0	63,7
No se	5,9	5,0	5,4
No respuesta	0,5	0,2	0,3
Total	100,0	100,0	100,0

El 63,7% de los estudiantes considera que está bien informado sobre las consecuencias del consumo de drogas, en similar proporción varones y mujeres.

Cuadro 10.2: Distribución porcentual de los estudiantes según Percepción de información según tamos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Te sentís lo suficientemente informado sobre las consecuencias del consumo de drogas	Edad		
	14 o menos	15 y 16	17 y más
Nada informado	5,6	2,5	1,7
Poco informado	29,4	28,0	22,6
Bien informado	58,1	63,3	72,3
No se	6,4	6,2	3,5
No respuesta	0,6	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0

A medida que aumenta la edad, se observa un porcentaje más alto de estudiantes que se consideran bien informados.

De acuerdo al cuadro siguiente, el sentirse “bien informado” opera como factor de protección ante el consumo de sustancias ilícitas, excepto marihuana, y lícitas de uso indebido (psicofármacos sin prescripción médica y solventes e inhalantes), aunque no ante el de tabaco y alcohol.

Cuadro 10.3: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según nivel de información. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2007.

Sustancias psicoactivas	Te sentís lo suficientemente informado sobre las consecuencias del consumo de drogas?			
	Nada informado	Poco Informado	Bien Informado	No se
Tabaco	35,5	34,5	36,8	34,7
Alcohol	51,5	60,1	65,4	59,4
Tranquilizantes sin pm	5,0	0,9	1,8	3,2
Estimulantes sin pm	6,4	1,7	1,8	2,5
Solventes o inhalantes	7,0	1,5	1,4	0,8
Marihuana	13,1	10,0	15,9	11,4
Pasta base – Paco	3,6	0,7	0,9	1,5
Cocaína	9,3	1,6	3,5	2,0
Éxtasis	7,8	0,6	1,7	2,3
Otras drogas	6,3	1,2	2,6	0,7
Alguna Droga ilícita	16,0	11,0	16,8	13,6

Menos de la mitad de los estudiantes dijeron haber recibido alguna vez cursos de prevención sobre consumo de drogas, sin diferencias por sexo.

Cuadro 10.4: Distribución porcentual de los estudiantes según recepción de cursos de prevención según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Has recibido en tu colegio cursos sobre prevención del consumo de drogas?	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
No recibí	49,9	55,2	52,8
Una vez	23,4	21,1	22,1
Varias veces	15,7	15,6	15,6
No sé	8,2	6,9	7,5
No respuesta	2,8	1,2	2,0
Total	100,0	100,0	100,0

Los estudiantes de mayor edad han recibido en mayor proporción cursos de prevención sobre el consumo de drogas, probablemente por haber pasado más tiempo en el sistema educativo.

Cuadro 10.5: Distribución porcentual de los estudiantes según recepción de cursos de prevención según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Has recibido en tu colegio cursos sobre prevención del consumo de drogas?	Edad		
	14 o menos	15 y 16	17 y más
No recibí	55,5	54,6	47,2
Una vez	20,0	21,7	26,3
Varias veces	13,4	15,4	17,6
No sé	8,3	7,0	7,7
No respuesta	2,8	1,3	1,2
Total	100,0	100,0	100,0

Indagar sobre el imaginario de los estudiantes acerca de las causas del consumo de drogas se constituye en un aspecto que contribuye a la explicación sobre el propio comportamiento.

Los datos indican que para el 37,1% de los estudiantes, la gente consume drogas porque tiene problemas personales, seguido por motivos que tienen que ver con el placer y la diversión que el consumo de sustancias genera (20,1%) y porque la mayoría de sus amigos consume (20,5%) , mostrando la influencia del entorno en el consumo. La desinformación sobre los daños es señalado como motivo del consumo por el 6,9% de los estudiantes.

Las opiniones presentan diferencias según sean varones o mujeres. Las adolescentes en mayor proporción opinan que los problemas personales son el fundamento del consumo, seguido por la influencia del grupo de amigos. Entre los varones, en cambio, si bien el argumento de los problemas personales también es el principal, lo es en menor medida y como segundo lugar aparecen los motivos relacionados a la búsqueda de placer y diversión.

Cuadro 10.6: Distribución de los estudiantes según causas de consumo según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Pensás que la gente consume drogas preferentemente porque:	Sexo		
	Varones	Mujeres	Total
No está informada sobre los daños que producen	8,7	5,4	6,9
Tiene problemas personales	34,9	39,0	37,1
Le gusta, le divierte, le da placer	24,2	16,6	20,1
Esta informada pero no le importa	10,5	16,0	13,7
Porque la mayoría de sus amigos consume	19,1	21,7	20,5
Otra	0,6	0,3	0,4

Cada porcentaje es independiente entre si y está calculado sobre el total de estudiantes y el total de varones y mujeres.

Para los estudiantes de todas las edades el tener problemas personales es la principal causa de consumo, aunque en menor proporción para los mayores. En segundo lugar los de 17 años y más mencionan la búsqueda de placer, y los más pequeños, la influencia de los amigos.

Cuadro 10.7: Distribución porcentual de los estudiantes según causas de consumo según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Pensás que la gente consume drogas preferentemente porque:	Edad		
	14 o menos	15 y 16	17 y más
No está informada sobre los daños que producen	9,1	6,4	4,5
Tiene problemas personales	40,3	37,9	32,3
Le gusta, le divierte, le da placer	17,4	18,7	24,7
Esta informada pero no le importa	8,1	15,3	17,9
Porque la mayoría de sus amigos consume	20,5	20,4	20,9
Otra	0,3	0,7	0,4

Cada porcentaje es independiente entre si y está calculado sobre el total de estudiantes y el total de cada grupo de edad.

El mayor consumo ocurre en el grupo de estudiantes que piensa que la gente consume drogas porque le gusta, le divierte y le da placer. Aunque la pregunta no haya sido dirigida a las razones del propio consumo, esta asociación estaría indicando la razón individual al consumo.

Cuadro 10.8: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según percepción sobre las causas del consumo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2009.

Sustancias psicoactivas	La gente consume drogas porque....				
	No está informada sobre los daños que producen	Tiene problemas personales	Le gusta, le divierte, le da placer	Esta informada pero no le importa	La mayoría de sus amigos consume
Tabaco	30,2	33,2	47,0	33,1	35,8
Alcohol	51,9	60,1	70,3	67,4	67,2
Tranquilizantes sin pm	0,4	1,2	3,3	2,2	1,3
Estimulantes sin pm	1,6	1,3	3,7	1,8	1,5
Solventes/inhalantes	0,4	1,1	3,1	1,4	1,6
Marihuana	5,4	9,8	29,9	12,6	11,6
Pasta base – Paco	0,0	1,2	1,2	0,9	0,7
Cocaína	0,0	2,4	6,8	3,2	2,5
Éxtasis	1,9	1,2	2,9	1,3	1,3
Otras drogas	0,0	1,4	5,5	1,5	1,7
Alguna droga ilícita	7,2	10,8	30,9	13,7	13,0

XI. TENDENCIA 2001 – 2005 – 2007 - 2009

La SEDRONAR realizó en el año 2009 la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, sobre una muestra nacional y provincial, acerca del consumo de sustancias psicoactivas.

Con el objetivo de continuar con el análisis de tendencia sobre el consumo de sustancias en esta población, se optó por emplear la misma metodología (cuestionario, muestra y abordaje de campo) que en estudios anteriores.

Para homogeneizar los dominios escolares, en la base 2001 se retuvo solo los años 8º, 1º y 3º, que corresponden a la mayoría de niños con 13, 15 y 17 años. Como la muestra 2001 podía tener desajustes a nivel del peso que cada año tiene en la matrícula total, se ajustaron las ponderaciones en la base 2001 para reproducir la estructura de la base 2005. Si bien puede haber habido cambios en la estructura escolar en esos años, dada la importancia de la edad en la mayoría de las preguntas de la encuesta era necesario homogeneizar los pesos relativos de cada año escolar en el total. Con estos pasos se obtuvieron cuatro bases comparables.

A continuación se presentan las tasas de prevalencia de vida, del último año y del último mes por edad y sexo de la provincia de Río Negro.

1) Tendencia en la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas⁶

Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 11.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009.

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007	2009
Tabaco	52,0	56,2	53,9	55,6
Alcohol	73,1	71,9	70,3	76,9
Tranquilizantes sin pm	8,6	7,0	7,4	4,0
Estimulantes sin pm	5,5	5,1	4,6	3,3
Solventes / Inhalantes	2,0	7,8	4,2	3,8
Marihuana	6,8	14,8	14,9	18,7
Pasta base – Paco	1,4	3,0	3,0	2,3
Cocaína	2,2	4,6	4,9	5,5
Heroína	0,5	0,4	1,4	1,1
Opio	0,1	0,5	1,1	1,2
Morfina	0,3	1,1	1,6	1,9
Alucinógenos	1,7	0,8	1,9	2,2
Hashis	0,1	1,0	1,0	1,4
Crack	0,8	0,6	0,7	1,2
Extasis	0,4	1,0	2,4	3,0

Cuadro 11.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009.

Sustancias psicoactivas	Varones				Mujeres			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	47,8	55,8	51,5	52,7	55,4	56,6	56,0	58,2
Alcohol	73,7	72,7	69,0	75,9	72,7	71,1	71,0	77,7
Tranq. sin pm	7,4	7,7	5,4	3,5	9,5	6,5	8,8	4,5
Estimulantes sin pm	3,9	5,7	4,5	3,6	6,4	4,6	4,1	3,2
Solventes / Inhalantes	1,6	9,2	5,2	4,9	2,0	6,6	3,1	2,8
Marihuana	7,6	17,4	19,4	23,0	4,8	12,5	11,3	15,0
Pasta base – Paco	1,9	2,6	3,9	3,3	0,6	3,3	2,3	1,5
Cocaína	2,8	5,7	6,4	7,6	1,2	3,6	3,6	3,7
Heroína	--	0,9	2,2	1,5	0,6	0,1	0,7	0,7
Opio	0,3	0,7	1,3	1,9	--	0,4	0,8	0,5
Morfina	0,2	0,8	2,4	2,0	--	1,2	0,8	1,6
Alucinógenos	2,1	1,5	2,6	2,8	0,9	0,2	1,1	1,6
Hashis	0,2	1,2	1,5	1,9	--	0,9	0,5	0,8
Crack	0,9	0,7	1,5	1,5	0,3	0,5	0,1	0,9
Extasis	--	1,3	2,8	3,7	0,3	0,8	2,0	2,3

⁶ Las prevalencias del 2007 de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica han sido ajustadas en su cálculo, por lo que difieren de las presentadas en el informe de dicho estudio.

Cuadro 11.3 Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009

Sustancias psico-activas	14 años o menos				15-16 años				17 años y más			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	35,6	38,9	37,6	43,9	60,9	67,7	61,6	57,1	64,9	73,9	70,2	68,5
Alcohol	55,5	55,1	50,3	61,7	84,2	83,5	77,6	82,1	81,9	88,4	93,3	89,7
Tranq. sin pm	5,6	5,0	5,1	3,0	9,5	7,3	9,9	3,4	13,5	10,8	10,0	5,7
Estim. sin pm	1,1	3,9	3,3	2,8	7,5	5,8	8,2	3,2	10,5	6,6	5,0	3,8
Solventes / Inhalantes	0,6	7,4	3,2	3,3	1,5	7,9	5,5	4,3	7,3	8,6	6,2	3,7
Marihuana	--	6,9	6,4	10,5	9,6	16,1	15,3	17,2	15,2	28,6	29,2	32,0
Pasta base - Paco	--	2,8	2,2	2,6	1,9	2,8	4,9	2,4	3,8	3,6	1,7	1,5
Cocaína	--	3,0	2,4	3,2	3,8	5,4	4,9	5,0	2,8	6,6	9,1	8,9
Heroína	--	0,2	1,4	1,7	0,3	0,7	1,1	0,8	2,7	0,6	1,7	0,7
Opio	--	0,2	0,8	1,0	0,3	1,1	1,2	1,3	--	0,4	1,4	1,1
Morfina	--	0,7	1,2	2,1	0,6	1,0	2,5	1,9	--	1,7	0,9	1,4
Alucinógenos	--	0,6	1,1	1,3	2,4	1,2	0,9	1,6	3,5	0,8	4,4	3,9
Hashis	--	0,2	0,6	0,7	0,2	1,4	1,0	1,5	--	2,1	1,3	1,9
Crack	--	0,2	0,7	1,8	0,9	1,3	0,7	0,6	2,6	0,4	0,8	1,1
Extasis	--	0,2	1,9	3,2	0,3	1,1	2,5	2,1	1,5	2,6	3,1	3,8

Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 11.4 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007	2009
Tabaco	38,0	37,3	36,3	36,0
Alcohol	62,0	60,6	63,4	63,1
Tranquilizantes sin pm	3,9	4,1	4,9	1,8
Estimulantes sin pm	3,2	3,6	2,3	1,9
Solventes / Inhalantes	1,3	4,0	2,2	1,6
Marihuana	5,3	9,0	10,9	13,9
Pasta base - Paco	0,8	1,4	1,3	1,0
Cocaína	1,8	2,7	2,5	3,1

Cuadro 11.5 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009

Sustancias psicoactivas	Varones				Mujeres			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	32,4	37,2	31,4	31,9	42,2	37,5	40,3	39,4
Alcohol	60,9	61,6	62,6	62,6	62,7	59,7	63,7	63,4
Tranquilizantes sin pm	2,7	4,7	4,1	1,6	5,0	3,7	5,1	1,9
Estimulantes sin pm	2,1	3,9	2,8	2,1	3,6	3,4	1,7	1,9
Solventes / Inhalantes	0,7	4,1	2,7	2,2	1,4	3,9	1,8	1,0
Marihuana	6,8	10,5	13,9	17,2	2,9	7,6	8,6	11,1
Pasta base - Paco	1,3	1,2	1,5	1,5	--	1,6	1,1	0,5
Cocaína	1,8	2,7	3,4	4,5	1,2	2,7	1,7	2,0

Cuadro 11.6 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009

Sustancias psico-activas	14 años o menos				15-16 años				17 años y más			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	21,3	23,5	24,4	28,9	46,1	45,5	41,7	37,6	54,5	52,3	49,2	43,3
Alcohol	43,0	42,2	41,7	46,3	74,5	70,8	71,4	69,1	69,9	81,2	88,2	80,1
Tranq. sin pm	1,1	3,7	3,1	1,0	5,7	4,2	4,8	1,8	5,0	5,0	7,4	2,0
Estim. sin pm	0,4	2,8	1,6	1,8	4,4	4,1	3,1	1,8	6,4	4,4	2,5	1,8
Solventes / Inhalantes	--	3,2	2,1	1,6	1,1	5,4	2,4	1,6	5,0	3,6	2,1	1,5
Marihuana	--	4,2	4,1	7,6	8,0	11,2	11,5	13,1	9,9	15,8	22,1	23,8
Pasta base - Paco	--	1,5	1,0	0,9	1,2	1,3	2,0	1,5	1,5	1,4	0,8	0,4
Cocaína	--	2,1	1,0	1,8	2,8	3,6	2,3	2,7	2,8	2,7	5,3	5,3

Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 11.7 Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007	2009
Tabaco	31,6	29,7	29,0	26,7
Alcohol	53,9	50,4	58,4	47,0
Tranquilizantes sin pm	2,1	2,6	2,4	1,2
Estimulantes sin pm	2,0	2,3	1,4	1,0
Solventes / Inhalantes	0,7	2,5	1,2	1,0
Marihuana	2,2	4,8	6,4	8,4
Pasta base - Paco	--	0,9	0,7	0,4
Cocaína	1,0	1,3	1,0	1,8

Cuadro 11.8 Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009

Sustancias psicoactivas	Varones				Mujeres			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	27,2	28,6	24,3	23,0	34,8	30,7	33,1	29,6
Alcohol	52,5	52,4	57,9	47,9	54,5	48,6	58,4	46,1
Tranquilizantes sin pm	1,1	2,5	2,1	1,3	3,0	2,7	2,2	1,1
Estimulantes sin pm	1,6	2,4	1,7	1,1	2,1	2,2	0,9	1,0
Solventes / Inhalantes	0,7	2,5	1,4	1,3	0,8	2,4	1,1	0,7
Marihuana	2,8	5,4	8,7	11,1	1,1	4,3	4,6	6,2
Pasta base - Paco	--	0,8	1,1	0,5	--	1,0	0,4	0,2
Cocaína	1,2	1,2	1,6	2,6	0,5	1,4	0,5	1,0

Cuadro 11.9 Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Río Negro. 2001, 2005, 2007 y 2009

Sustancias psicoactivas	14 años o menos				15-16 años				17 años y más			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	17,9	17,4	18,7	21,5	36,0	36,2	34,0	26,0	52,2	44,3	40,3	34,0
Alcohol	36,2	32,6	36,7	29,0	65,5	58,4	67,2	52,2	61,1	73,2	82,2	65,5
Tranquilizantes sin pm	0,7	2,4	2,0	1,0	2,8	2,3	2,5	1,0	3,3	3,7	2,4	1,1
Estimulantes sin pm	0,4	1,9	1,3	0,7	2,8	2,9	1,9	1,1	3,7	2,4	0,8	1,0
Solventes / Inhalantes	--	2,0	1,6	1,1	0,5	2,8	1,3	1,0	3,5	2,8	0,6	0,7
Marihuana	--	2,2	2,3	3,9	3,1	5,7	6,7	8,1	5,1	9,2	13	15,0
Pasta base – Paco	--	0,9	0,9	0,4	--	1,1	1,0	0,5	--	0,4	0,0	0,2
Cocaína	--	0,8	0,3	1,3	1,3	1,9	0,9	1,3	2,2	1,6	2,3	2,8