



---

**ESTUDIO NACIONAL EN POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS, SOBRE  
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  
ARGENTINA 2006**

**RESULTADOS PRELIMINARES  
MARZO 2007**

**Área de Investigaciones  
Observatorio Argentino de Drogas**

## **Introducción**

La Secretaría de Programación para Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de Presidencia de la Nación, realizó a través de su Observatorio Argentino de Drogas (OAD), el Tercer Estudio Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de 12 a 65 años, de todas las localidades del país que tienen 80.000 habitantes y más.

Este estudio se realiza en el marco del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, coordinado por la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) de Naciones Unidas y por Observatorio Interamericano de Drogas (OID), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la OEA. Los equipos técnicos de los Observatorios Nacionales de Drogas de cada uno de los países que participan del Sistema Subregional, acordaron metodología (instrumento y aspectos del muestreo) para hacer comparables los datos nacionales.

El financiamiento del Tercer Estudio Nacional se realizó mediante fondos propios de SEDRONAR, el aporte de ONUDD y de CICAD. La planificación y ejecución del trabajo de campo, la elaboración de la muestra, edición y digitación de la base de datos, análisis de consistencia, fueron realizadas por la consultora Opinión Pública Servicios y Mercados (OPSM), ganadora del proceso de Licitación Pública Internacional convocada para tal fin. La dirección técnica del estudio, el análisis de los datos y la elaboración del informe estuvo a cargo del Área de Investigaciones del OAD. El OID-CICAD realizó el procesamiento de las variables que indican prevalencia, incidencia y dependencia.

Si bien este estudio en población general es el tercero que el país realiza, no es posible realizar análisis comparativos entre los mismos. Diferentes metodologías y niveles de cobertura muestral impiden establecer tendencias a partir de los mismos. La utilización en este Tercer Estudio Nacional de metodologías homologadas internacionalmente, forma parte de una decisión estratégica para garantizar hacia el futuro la comparabilidad de la información obtenida. En este sentido, el OAD ha definido una periodicidad bienal para la realización de los Estudios Nacionales sobre consumo de sustancias psicoactivas.

Se considera que la información válida sobre el fenómeno del consumo de drogas en el país, es aquella que permita identificar a la población objetivo según pertenezca a grupos de riesgo, grupos de usuarios experimentales y abusadores y los grupos con síntomas de dependencia o adicción al consumo de alguna sustancia psicoactiva.

Orientar las políticas preventivas y asistenciales requiere necesariamente poder diferenciar el peso relativo que cada uno de estos grupos tiene en el país, dónde se localizan según espacios territoriales, qué características sociales tienen (clases sociales o niveles socioeconómicos, edad, sexo, nivel de educación) y cuáles son los patrones de consumo que manifiestan (tipo de sustancia, frecuencia de uso, edad de inicio). Se podría afirmar que si se tiene un conocimiento cierto sobre estas tres dimensiones del problema del uso indebido de sustancias psicoactivas en el país, la definición de las políticas podrían alcanzar un nivel de precisión acorde a la descripciones de la problemática.

## PRINCIPALES RESULTADOS

Este Informe Preliminar presenta los resultados sobre Consumo o Prevalencia de vida, año y mes para todas las sustancias psicoactivas, según sexo, grupos de edad, nivel de educación, Regiones del país y tamaño de conglomerados urbanos.

Se muestran algunos indicadores generales de factores de riesgo-protección, como la percepción de riesgo, oferta y accesibilidad al consumo de drogas ilícitas y propensión a consumir.

### 1) Prevalencia de VIDA de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Total	Intervalo de confianza	
Tabaco	8.982.400 <b>51,7</b>	50,4	53,0
Alcohol	12.844.582 <b>73,9</b>	72,8	75,0
Marihuana	2.754.066 <b>15,8</b>	14,9	16,8
Cocaína	1.376.476 <b>7,9</b>	7,2	8,6
Pasta Base	178.703 <b>1,0</b>	0,8	1,3
Crack	33.745 <b>0,2</b>	0,1	0,3
Éxtasis	249.311 <b>1,4</b>	1,1	1,7
Alucinógenos	286.625 <b>1,6</b>	1,3	2,0
Inhalantes	202.289 <b>1,2</b>	0,9	1,4
Estimulantes sin prescripción médica	273.985 <b>1,6</b>	1,3	1,9
Tranquilizantes sin prescripción médica	625.333 <b>3,6</b>	3,1	4,1
Hashis	316.584 <b>1,8</b>	1,5	2,2
Heroína	61.865 <b>0,4</b>	0,2	0,5
Opio	44.186 <b>0,3</b>	0,1	0,4
Morfina	23.286 <b>0,1</b>	0,0	0,2

Ketamina	84.004 <b>0,5</b>	0,3	0,7
Otras drogas	60.874 <b>0,4</b>	0,2	0,5

Cuadro 2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Varones	Mujeres	Total
Tabaco	4.764.881	4.217.519	8.982.400
	<b>56,9%</b>	<b>46,8%</b>	<b>51,7%</b>
Alcohol	6.685.563	6.159.018	12.844.581
	<b>79,9%</b>	<b>68,4%</b>	<b>73,9%</b>
Marihuana	1.554.688	1.199.378	2.754.066
	<b>18,6%</b>	<b>13,3%</b>	<b>15,8%</b>
Cocaína	771.579	604.897	1.376.476
	<b>9,2%</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,9%</b>
Pasta Base	104.274	74.430	178.704
	<b>1,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</b>
Crack	15.057	18.688	33.745
	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
Éxtasis	143.199	106.111	249.310
	<b>1,7%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,4%</b>
Alucinógenos	153.543	133.082	286.625
	<b>1,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,6%</b>
Inhalantes	125.158	77.132	202.290
	<b>1,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,2%</b>
Estimulantes sin prescripción médica	164.063	109.923	273.986
	<b>2,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,6%</b>
Tranquilizantes sin prescripción médica	276.098	349.235	625.333
	<b>3,3%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,6%</b>
Hashis	181.639	134.945	316.584
	<b>2,2%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,8%</b>
Heroína	36.084	25.781	61.865
	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>
Opio	24.194	19.991	44.185
	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>
Morfina	13.098	10.188	23.286
	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
Ketamina	47.927	36.077	84.004
	<b>0,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,5%</b>
Otras drogas	35.663	25.211	60.874
	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>

La prevalencia de vida indica la proporción de personas que han consumido alguna vez en la vida alguna de estas sustancias psicoactivas, sobre el total de personas bajo estudio.

Las sustancias legales, alcohol y tabaco, son las principales sustancias de consumo: el 51.7% de la población entre 12 a 65 años que viven en localidades de 80 mil habitantes y más, ha fumado alguna vez en la vida y el 73.9% ha tomado alguna vez alguna bebida alcohólica. En ambas sustancias, el consumo ocurre en mayor proporción entre los varones, casi 10 puntos porcentuales más que las mujeres.

El consumo de psicofármacos sin prescripción médica, es decir, de uso indebido, es del 3.6% y del 1.6% en tranquilizantes y estimulantes respectivamente. Las mujeres han probado en mayor proporción tranquilizantes y los varones estimulantes.

La droga ilícita que en mayor proporción fue consumida alguna vez en la vida es la marihuana seguida por el clorhidrato de cocaína (15.8% y 7.9%), en ambos casos más los varones, pero es importante el consumo entre las mujeres.

Alucinógenos, éxtasis, inhalables y pasta base fueron consumidas alguna vez en la vida en porcentajes que oscilan entre el 1% y el 1.6%, siempre es mayor la proporción entre los varones.

Cuadro 3: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según grupos de edad. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancias	Grupo de Edad					Total
	12 a 17 años	18 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	
Tabaco	26,7%	55,3%	54,2%	55,4%	55,4%	51,7%
Alcohol	50,4%	83,9%	80,7%	74,4%	73,1%	73,9%
Marihuana	12,2%	22,2%	22,0%	13,7%	11,1%	15,8%
Cocaína	6,0%	9,1%	10,9%	7,5%	6,2%	7,9%
Pasta Base	1,2%	1,3%	1,4%	1,0%	0,5%	1,0%
Crack	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
Éxtasis	0,9%	2,0%	1,7%	1,4%	1,2%	1,4%
Alucinógenos	1,4%	1,9%	2,6%	1,4%	1,2%	1,6%
Inhalantes	1,3%	1,4%	0,9%	1,4%	0,9%	1,2%
Estimulantes sin prescripción médica	1,2%	1,4%	2,1%	1,8%	1,3%	1,6%
Tranquilizantes sin prescripción médica	2,5%	3,6%	4,2%	3,8%	3,4%	3,6%
Hashis	1,1%	2,0%	2,8%	1,8%	1,3%	1,8%
Heroína	0,1%	0,7%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%
Opio	0,1%	0,5%	0,3%	0,2%	0,1%	0,3%
Morfina	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Ketamina	0,2%	0,7%	0,8%	0,3%	0,4%	0,5%
Otras drogas	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%

El consumo de alguna vez en la vida de tabaco es menor en el grupo de población que tiene entre 12 a 17 años. El consumo de alcohol, marihuana y cocaína, ocurre en mayor proporción entre la población de 18 a 34 años. El consumo de pasta base tiene prevalencias mayores al promedio entre la población de 12 a 34 años. El consumo de

estimulantes sin prescripción médica presenta porcentajes mayores entre la población que tiene de 25 a 49 años, en tanto que quienes consumen tranquilizantes sin prescripción médica, lo hacen en mayor medida en una mayor amplitud de edades, entre 18 a 65 años.

Entre los 18 a los 34 años se encuentran los porcentajes mayores de consumo para las demás sustancias analizadas, con excepción de inhalables, que presenta mayor consumo entre los más jóvenes, de 12 a 24 años.

Cuadro 4: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según nivel de instrucción. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Nivel de Instrucción						Total
	hasta primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario/uni versitario incompleto	terciario/uni versitario completo	
Tabaco	45,6%	53,3%	51,2%	52,7%	52,9%	51,2%	51,7%
Alcohol	61,6%	69,7%	70,7%	75,8%	84,7%	80,4%	73,9%
Marihuana	13,1%	12,3%	16,3%	15,2%	21,7%	17,2%	15,8%
Cocaína	7,3%	7,1%	9,4%	7,0%	8,5%	7,7%	7,9%
Pasta Base	1,3%	0,7%	1,5%	0,9%	0,8%	0,8%	1,0%
Crack	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
Éxtasis	1,2%	1,0%	1,6%	1,4%	2,4%	1,0%	1,4%
Alucinógenos	1,1%	1,6%	2,2%	1,1%	2,2%	1,6%	1,6%
Inhalantes	1,4%	1,0%	1,5%	1,1%	0,7%	0,9%	1,2%
Estimulantes s/PM	1,8%	1,7%	1,6%	1,2%	1,7%	1,7%	1,6%
Tranquilizantes s/PM	2,6%	3,4%	3,8%	4,0%	3,3%	3,7%	3,6%
Hashis							

	1,8%	1,7%	1,8%	1,2%	2,8%	2,2%	1,8%
<b>Heroína</b>							
	0,5%	0,3%	0,5%	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%
<b>Opio</b>							
	0,1%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,4%	0,3%
<b>Morfina</b>							
		0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
<b>Ketamina</b>							
	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%	0,8%	0,3%	0,5%
<b>Otras drogas</b>							
	0,4%	0,4%	0,3%	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%

La descripción del consumo de alguna vez en la vida por nivel de educación alcanzado, presenta diferencias según las sustancias.

El consumo de tabaco tiene porcentajes similares en todos los niveles educativos, menor entre los que no completaron el nivel primario, pero seguramente este dato esté relacionado a la edad (a menor edad, menor consumo).

El consumo de alcohol es mayor a medida que se incrementa el nivel de educación alcanzado. El consumo de marihuana y cocaína ocurre en mayor proporción entre las personas que no concluyeron un nivel de educación, sea el secundario o el universitario. Este patrón también se observa entre los consumidores de éxtasis y alucinógenos.

El consumo de pasta base e inhalables presenta mayores porcentajes entre quienes no terminaron el nivel primario y el nivel secundario, también el consumo era mayor entre los más jóvenes.

El consumo de estimulantes sin prescripción médica se distribuye regularmente en todos los niveles educativos, en cambio, el de tranquilizantes se incrementa a medida que aumenta el nivel educativo.

Cuadro 5: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según regiones. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Regiones						
	Metropolita na	Pampea na	NEA	CUYO	NOA	Patagonia	Total
Tabaco	53,0%	50,4%	38,0%	51,3%	56,2%	53,9%	51,7%
Alcohol	73,1%	76,8%	63,9%	73,9%	77,8%	70,6%	73,9%
Marihuana	17,4%	15,7%	10,1%	12,5%	13,6%	17,0%	15,8%
Cocaína	8,6%	7,8%	5,3%	6,5%	7,0%	8,8%	7,9%
Pasta Base	1,1%	0,8%	0,7%	1,7%	1,1%	1,4%	1,0%
Crack	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,5%	0,2%
Éxtasis	1,7%	1,7%	0,3%	0,5%	1,1%	1,1%	1,4%
Alucinógenos	1,9%	1,5%	0,6%	1,4%	1,5%	1,9%	1,6%
Inhalantes	1,4%	1,0%	1,0%	0,8%	0,9%	0,6%	1,2%
Estimulantes s/PM	1,7%	1,7%	0,7%	1,2%	1,1%	1,9%	1,6%
Tranquilizantes s/PM	3,6%	4,2%	2,4%	2,6%	3,4%	4,0%	3,6%
Hashis	2,1%	1,9%	0,8%	0,8%	1,6%	1,8%	1,8%
Heroína	0,4%	0,2%	0,1%	0,5%	0,4%	0,6%	0,4%
Opio	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,5%	0,3%
Morfina	0,1%	0,2%		0,1%	0,0%		0,1%
Ketamina	0,5%	0,3%	0,1%	0,5%	0,9%	0,3%	0,5%
Otras drogas	0,3%	0,5%	0,1%	0,1%	0,6%	0,3%	0,4%

El análisis del consumo de alguna vez en la vida por regiones muestra, como era lo esperable, un mayor consumo para todas las sustancias en el Área Metropolitana y en la Patagonia. En esta última, con excepción de alcohol, éxtasis y ketamina.

El mayor consumo de alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, psicofármacos sin prescripción médica, hashis y morfina, se observa también en la región Pampeana.

El mayor consumo de pasta base y crack también se observa en la región Cuyo, en tanto que de tabaco y alcohol en el NOA, conjuntamente con heroína y opio.

La región NEA es la que presenta las menores prevalencias de consumo en todas las sustancias analizadas.

Cuadro 6: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según tamaño de conglomerados. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Tamaño de conglomerados			
	1.5 millones	500 mil a 1.5 millones	80 mil a 500 mil	Total
Tabaco	53,0%	53,7%	47,3%	51,7%
Alcohol	73,1%	79,6%	70,1%	73,9%
Marihuana	17,4%	15,4%	13,3%	15,8%
Cocaína	8,6%	7,5%	7,0%	7,9%
Pasta Base	1,1%	1,2%	0,8%	1,0%
Crack	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%
Éxtasis	1,7%	1,5%	1,0%	1,4%
Alucinógenos	1,9%	1,3%	1,5%	1,6%
Inhalantes	1,4%	0,8%	1,1%	1,2%
Estimulantes s/PM	1,7%	1,6%	1,3%	1,6%
Tranquilizantes s/PM	3,6%	4,2%	3,0%	3,6%
Hashis	2,1%	1,5%	1,7%	1,8%
Heroína	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%
Opio	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%
Morfina	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%
Ketamina	0,5%	0,6%	0,3%	0,5%
Otras drogas	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%

En todas las sustancias, el mayor consumo se presenta en los conglomerados mayores, es decir que el consumo se incrementa conforme aumenta la densidad poblacional.

## 1) Prevalencia de AÑO de consumo de sustancias psicoactivas

La prevalencia de año o consumo reciente, indica la proporción de personas que consumió cada una de las sustancias en los últimos 12 meses, sobre el total de personas bajo estudio.

Cuadro 7: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Total	Intervalo de confianza	
<b>Tabaco</b>	6.035.831 <b>34,7</b>	33,5	35,9
<b>Alcohol</b>	10.923.888 <b>62,9</b>	61,6	64,1
<b>Marihuana</b>	1.191.049 <b>6,9</b>	6,2	7,5
<b>Cocaína</b>	444.171 <b>2,6</b>	2,2	3,0
<b>Pasta Base</b>	84.911 <b>0,5</b>	0,3	0,7
<b>Éxtasis</b>	80.916 <b>0,5</b>	0,3	0,6
<b>Inhalantes</b>	10.310 <b>0,1</b>	0,0	0,1
<b>Estimulantes sin prescripción médica</b>	63.245 <b>0,4</b>	0,2	0,5
<b>Tranquilizantes sin prescripción médica</b>	205.063 <b>1,2</b>	0,9	1,5
<b>Otras drogas</b>	55.502 <b>0,3</b>	0,2	0,5

El consumo reciente de alcohol involucra al 62.9% de la población de 12 a 65 años. El 34.7% de la población fumó en el último año, el 6.9% consumió marihuana y un 2.6% clorhidrato de cocaína.

Tranquilizantes sin prescripción médica fue consumida en el último año por el 1.2% de la población bajo análisis.

Cuadro 8: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Varones	Mujeres	Total
<b>Tabaco</b>	3.215.813 <b>38,4%</b>	2.820.018 <b>31,3%</b>	6.035.831 <b>34,7%</b>
<b>Alcohol</b>	5.925.898 <b>70,8%</b>	4.997.990 <b>55,5%</b>	10.923.888 <b>62,9%</b>
<b>Marihuana</b>	694.111 <b>8,3%</b>	496.938 <b>5,5%</b>	1.191.049 <b>6,9%</b>
<b>Cocaína</b>	253.779 <b>3,0%</b>	190.392 <b>2,1%</b>	444.171 <b>2,6%</b>
<b>Pasta Base</b>	53.684 <b>0,6%</b>	31.227 <b>0,3%</b>	84.911 <b>0,5%</b>
<b>Éxtasis</b>	37.614 <b>0,4%</b>	43.302 <b>0,5%</b>	80.916 <b>0,5%</b>
<b>Inhalantes</b>	10.310 <b>0,1%</b>		10.310 <b>0,1%</b>
<b>Estimulantes sin prescripción médica</b>	41.682 <b>0,5%</b>	21.563 <b>0,2%</b>	63.245 <b>0,4%</b>
<b>Tranquilizantes sin prescripción médica</b>	90.003 <b>1,1%</b>	115.060 <b>1,3%</b>	205.063 <b>1,2%</b>
<b>Otras drogas</b>	37.112 <b>0,4%</b>	18.389 <b>0,2%</b>	55.501 <b>0,3%</b>

El consumo de drogas lícitas e ilícitas es mayor entre los varones, con excepción de tranquilizantes sin prescripción médica y éxtasis, en donde las diferencias entre sexos es mínima.

Cuadro 9: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según grupos de edad. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancias	Grupo de Edad					Total
	12 a 17 años	18 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	
Tabaco	19,3%	42,2%	39,7%	37,3%	31,0%	34,7%
Alcohol	42,2%	74,5%	70,2%	63,2%	59,5%	62,9%
Marihuana	6,9%	10,3%	9,6%	4,9%	4,6%	6,9%
Cocaína	2,4%	3,3%	3,3%	2,3%	1,8%	2,6%
Pasta Base	0,9%	0,8%	0,5%	0,4%	0,2%	0,5%
Éxtasis	0,3%	0,7%	0,7%	0,4%	0,3%	0,5%
Inhalantes	0,3%	0,1%				0,1%
Estimulantes s/PM	0,4%	0,6%	0,4%	0,4%	0,2%	0,4%
Tranquilizantes s/PM	1,2%	1,1%	1,4%	1,0%	1,2%	1,2%
Otras drogas	0,2%	0,4%	0,6%	0,2%	0,2%	0,3%

Cualquiera sea la sustancia, el análisis del consumo reciente es mayor en la población que tiene entre 18 a 34 años. En el consumo de alcohol y tabaco, se extiende a los del tramo de 35 a 49 años. En el consumo de pasta base e inhalables, el mayor consumo también se observa en el grupo de menor edad, de 12 a 17 años y en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, el mayor consumo se da entre los 25 a 34 años.

Cuadro 10: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según nivel de instrucción. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Nivel de Instrucción						Total
	hasta primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario/uni versitario incompleto	terciario/uni versitario completo	
Tabaco	29,1%	35,3%	36,7%	35,3%	36,6%	31,0%	34,7%
Alcohol	50,1%	55,6%	59,8%	64,4%	77,3%	70,4%	62,9%
Marihuana	6,1%	5,2%	7,2%	6,7%	10,2%	6,1%	6,9%
Cocaína	2,2%	2,2%	3,6%	2,5%	2,3%	1,8%	2,6%
Pasta Base	0,5%	0,4%	0,7%	0,5%	0,3%	0,3%	0,5%
Éxtasis	0,2%	0,3%	0,4%	0,6%	0,9%	0,3%	0,5%
Inhalantes			0,2%		0,1%		0,1%
Estimulantes s/PM	0,6%	0,4%	0,5%	0,2%	0,4%	0,2%	0,4%
Tranquilizantes s/PM	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,5%	1,2%
Otras drogas	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%

El consumo reciente por nivel de educación, tiene una similar distribución al consumo global o de alguna vez en la vida. En este sentido, no se observan importantes diferencias en el consumo de tabaco; a medida que aumenta el nivel educativo se incrementa la prevalencia en el consumo de bebidas alcohólicas; es mayor el consumo de marihuana, cocaína, pasta base, inhalables y estimulantes sin prescripción médica en el grupo que no concluyó el nivel medio. El consumo reciente de marihuana y éxtasis también es mayor entre quienes no terminaron los estudios terciarios o universitarios. El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica es mayor entre los profesionales o técnicos.

Cuadro 11: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según regiones. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Regiones						
	Metropolita na	Pampea na	NEA	CUYO	NOA	Patagonia	Total
<b>Tabaco</b>	34,8%	35,7%	26,7%	34,0%	36,6%	36,1%	34,7%
<b>Alcohol</b>	62,0%	67,1%	54,7%	64,8%	61,8%	55,0%	62,9%
<b>Marihuana</b>	7,5%	7,2%	4,3%	5,1%	5,9%	6,1%	6,9%
<b>Cocaína</b>	3,0%	2,4%	1,4%	2,0%	2,0%	2,1%	2,6%
<b>Pasta Base</b>	0,5%	0,4%	0,4%	0,6%	0,6%	0,4%	0,5%
<b>Éxtasis</b>	0,6%	0,5%		0,1%	0,2%	0,2%	0,5%
<b>Inhalantes</b>	0,1%				0,1%	0,1%	0,1%
<b>Estimulantes s/PM</b>	0,4%	0,5%	0,2%	0,4%	0,2%	0,4%	0,4%
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	1,1%	1,4%	0,5%	1,2%	1,2%	2,1%	1,2%
<b>Otras drogas</b>	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,5%	0,1%	0,3%

El análisis del consumo reciente por regiones del país, a diferencia del consumo global, el Área Metropolitana no presenta mayor consumo en todas las sustancias, sino sólo en marihuana y cocaína, conjuntamente con la región Pampeana, en donde es mayor el consumo de alcohol y psicofármacos sin prescripción médica. Las regiones NOA y Patagonia, sobresalen en el consumo de tabaco, e inhalables. NOA y Cuyo en el consumo de pasta base, al igual que el Área Metropolitana, y en Cuyo el consumo de alcohol.

Cuadro 12: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según tamaño de conglomerados. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Tamaño de conglomerados			
	1.5 millones	500 mil a 1.5 millones	80 mil a 500 mil	Total
<b>Tabaco</b>	34,8%	37,0%	32,4%	34,7%
<b>Alcohol</b>	62,0%	67,4%	60,1%	62,9%
<b>Marihuana</b>	7,5%	6,5%	6,1%	6,9%
<b>Cocaína</b>	3,0%	2,4%	1,9%	2,6%
<b>Pasta Base</b>	0,5%	0,6%	0,3%	0,5%
<b>Éxtasis</b>	0,5%	0,6%	0,3%	0,5%
<b>Inhalantes</b>	0,1%			0,1%
<b>Estimulantes s/PM</b>	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	1,1%	1,6%	1,0%	1,2%
<b>Otras drogas</b>	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

El mayor consumo de tabaco y bebidas alcohólicas se observa en las ciudades intermedias, las que tienen entre 500 mil y 1,5 millones de habitantes, y tienen un consumo similar al Área Metropolitana en pasta base, éxtasis y psicofármacos sin prescripción médica.

El consumo de marihuana, cocaína y sustancias inhalables sobresale en el Área Metropolitana.

### 3) Prevalencia de MES de consumo de sustancias psicoactivas

La prevalencia de mes, también entendida como consumo actual, indica la proporción de personas que consumieron las sustancias en los últimos 30 días anteriores a la encuesta.

Cuadro 13: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006. Argentina 2006.

<b>Sustancia</b>	<b>Total</b>	<b>Intervalo de confianza</b>	
<b>Tabaco</b>	5.571.119 <b>32,1%</b>	30,9	33,2
<b>Alcohol</b>	8.758.367 <b>50,4%</b>	49,1	51,7
<b>Marihuana</b>	771.006 <b>4,4%</b>	3,9	5,0
<b>Cocaína</b>	277.434 <b>1,6%</b>	1,3	1,9
<b>Pasta Base</b>	41.934 <b>0,2%</b>	0,1	0,4
<b>Éxtasis</b>	27.959 <b>0,2%</b>	0,1	0,3
<b>Inhalantes</b>	2.899 <b>0,0%</b>	0,0	0,0
<b>Estimulantes s/PM</b>	33.618 <b>0,2%</b>	0,1	0,3
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	108.518 <b>0,6%</b>	0,4	0,8
<b>Otras drogas</b>	12.972 <b>0,1%</b>	0,0	0,1

Se puede considerar que más de un tercio de la población fuma actualmente y la mitad toma bebidas alcohólicas.

Un 4.4% fuma marihuana y un 1.6% consumo cocaína. Con consumo actual que representa el 0.2% se encuentra la pasta base, éxtasis y estimulantes sin prescripción médica. El uso actual de tranquilizantes sin prescripción médica alcanza al 0.6% de la población bajo estudio.

Cuadro 14: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

<b>Sustancia</b>	<b>Varones</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
<b>Tabaco</b>	2.949.314 <b>35,2%</b>	2.621.805 <b>29,1%</b>	5.571.119 <b>32,1%</b>
<b>Alcohol</b>	5.069.588 <b>60,6%</b>	3.688.779 <b>41,0%</b>	8.758.367 <b>50,4%</b>
<b>Marihuana</b>	436.910 <b>5,2%</b>	334.096 <b>3,7%</b>	771.006 <b>4,4%</b>
<b>Cocaína</b>	156.616 <b>1,9%</b>	120.818 <b>1,3%</b>	277.434 <b>1,6%</b>
<b>Pasta Base</b>	24.391 <b>0,3%</b>	17.543 <b>0,2%</b>	41.934 <b>0,2%</b>
<b>Éxtasis</b>	10.507 0,1%	17.452 0,2%	27.959 0,2%
<b>Inhalantes</b>	2.899 <b>0,0%</b>		2.899 <b>0,0%</b>
<b>Estimulantes s/PM</b>	20.330 <b>0,2%</b>	13.288 <b>0,1%</b>	33.618 <b>0,2%</b>
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	50.984 <b>0,6%</b>	57.534 <b>0,6%</b>	108.518 <b>0,6%</b>
<b>Otras drogas</b>	8.353 <b>0,1%</b>	4.619 <b>0,1%</b>	12.972 <b>0,1%</b>

La diferencia entre sexos en el consumo actual, se observa claramente en el consumo de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína, con mayor consumo por parte de los varones. En psicofármacos sin prescripción médica, pasta base y éxtasis, la distancia es menor.

Cuadro 15: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según grupos de edad. Población de 12 a 65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancias	Grupo de Edad					Total
	12 a 17 años	18 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	
<b>Tabaco</b>	16,7%	38,0%	37,3%	35,0%	28,7%	32,1%
<b>Alcohol</b>	28,5%	59,7%	57,5%	51,5%	48,4%	50,4%
<b>Marihuana</b>	4,8%	6,3%	5,7%	3,3%	3,3%	4,4%
<b>Cocaína</b>	1,5%	1,8%	2,2%	1,5%	1,1%	1,6%
<b>Pasta Base</b>	0,5%	0,4%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%
<b>Éxtasis</b>	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%
<b>Inhalantes</b>	0,1%					0,0%
<b>Estimulantes s/PM</b>	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	0,7%	0,5%	0,7%	0,5%	0,7%	0,6%
<b>Otras drogas</b>	0,1%	0,1%	0,2%		0,1%	0,1%

El mayor porcentaje de fumadores actuales se encuentra en el grupo de 18 a 24 años, pero también es importante entre los de 25 a 49 años de edad. En estos grupos etéreos, también encontramos las prevalencias actuales más altas de consumo de bebidas alcohólicas.

El consumo actual de marihuana, es más alto entre los 12 a los 34 años, y a medida que aumenta la edad al interior de este intervalo, se incrementa la prevalencia de consumo. En cambio, el consumo de cocaína es más alto en el grupo de 25 a 34 años y luego entre los de 18 a 24 años.

Pasta base y estimulantes sin prescripción médica es mayormente usado entre los más jóvenes, pero el uso de tranquilizantes sin prescripción médica tiene una distribución irregular en todas las edades, oscilando entre el 0.5% y 0.7%.

Cuadro 16: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según nivel de instrucción. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Nivel de Instrucción						Total
	hasta primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario/uni versitario incompleto	terciario/uni versitario completo	
<b>Tabaco</b>	27,2%	33,0%	33,2%	33,2%	32,7%	29,0%	32,1%
<b>Alcohol</b>	39,5%	44,5%	45,6%	51,8%	64,2%	58,7%	50,4%
<b>Marihuana</b>	5,0%	3,7%	4,9%	3,9%	5,9%	3,9%	4,4%
<b>Cocaína</b>	1,2%	1,6%	2,4%	1,3%	1,6%	1,0%	1,6%
<b>Pasta Base</b>	0,4%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
<b>Éxtasis</b>	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%
<b>Inhalantes</b>			0,1%				0,0%
<b>Estimulantes s/PM</b>	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	0,7%	0,4%	0,7%	0,5%	0,6%	1,0%	0,6%
<b>Otras drogas</b>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%		0,0%	0,1%

El mayor consumo actual de tabaco se encuentra en la población que concluyó el nivel primario y secundario, en tanto que la mayor prevalencia actual de alcohol se encuentra entre quienes terminaron el nivel medio y tienen incompleto el nivel superior.

El consumo actual de marihuana y pasta base se encuentra en mayor proporción en los niveles incompletos de educación, primario y secundario, más terciario en el caso de marihuana.

El mayor consumo de éxtasis se observa en el nivel terciario incompleto, el de estimulantes sin prescripción médica entre quienes terminaron la primaria pero no la secundaria y los que más consumen tranquilizantes son los profesionales.

Cuadro 17: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según regiones. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Regiones						
	Metropolitana	Pampeana	NEA	CUYO	NOA	Patagonia	Total
<b>Tabaco</b>	32,3%	33,0%	24,4%	31,7%	33,0%	33,0%	32,1%
<b>Alcohol</b>	50,5%	55,8%	45,1%	50,6%	41,1%	41,6%	50,4%
<b>Marihuana</b>	5,0%	4,4%	2,2%	3,6%	4,0%	2,8%	4,4%
<b>Cocaína</b>	1,9%	1,5%	0,5%	1,3%	1,0%	1,7%	1,6%
<b>Pasta Base</b>	1,9%	1,5%	0,5%	1,3%	1,0%	1,7%	1,6%
<b>Éxtasis</b>	0,2%	0,1%			0,1%	0,1%	0,2%
<b>Inhalantes</b>	0,0%				0,1%		0,0%
<b>Estimulantes s/PM</b>	0,2%	0,2%		0,4%	0,2%	0,3%	0,2%
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	0,6%	0,7%	0,2%	0,9%	0,6%	1,1%	0,6%
<b>Otras drogas</b>	0,1%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,1%

El mayor consumo actual de tabaco se observa en las regiones Pampeana, NOA y Patagonia, y de alcohol, en la región Pampeana, Cuyo y Área Metropolitana. El mayor consumo de marihuana se encuentra en el Área Metropolitana y Pampeana, en tanto que cocaína y pasta base en el Área Metropolitana y en la Patagonia.

El consumo actual de sustancias inhalables sólo fue captado en el NOA y los psicofármacos tienen mayor consumo en Cuyo y la Patagonia.

Cuadro 18: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según tamaño de conglomerados. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Sustancia	Tamaño de conglomerados			
	1.5 millones	500 mil a 1.5 millones	80 mil a 500 mil	Total
<b>Tabaco</b>	32,3%	34,1%	29,7%	32,1%
<b>Alcohol</b>	50,5%	53,6%	47,1%	50,4%
<b>Marihuana</b>	5,0%	4,3%	3,4%	4,4%
<b>Cocaína</b>	1,9%	1,4%	1,2%	1,6%
<b>Pasta Base</b>	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%
<b>Éxtasis</b>	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%
<b>Inhalantes</b>	0,0%	0,0%		0,0%
<b>Estimulantes s/PM</b>	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%
<b>Tranquilizantes s/PM</b>	0,6%	0,9%	0,5%	0,6%
<b>Otras drogas</b>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

En los conglomerados más grandes se encuentra el consumo actual más elevado, sobre todo de marihuana, cocaína y éxtasis. En tanto que el mayor consumo de tabaco, alcohol, pasta base y psicofármacos sin prescripción médica, en las localidades comprendidas entre 500 mil habitantes hasta 1,5 millones.

#### 4) Factores de riesgo-protección

Distintos son los factores de riesgo-protección que se indagaron en el estudio nacional, entre ellos la Percepción de riesgo, que es una medida subjetiva de percepción del daño asociado al consumo de determinada droga y algunos indicadores de propensión a consumir, tales como la Percepción de facilidad de acceso: medida subjetiva de la percepción de facilidad o dificultad para conseguir una droga determinada; la Curiosidad por probar alguna droga y la Percepción sobre la decisión del consumo o no frente a la ocasión de probar alguna droga.

A continuación se presentan algunos datos sobre estos indicadores.

Cuadro 19: Accesibilidad al consumo de drogas ilícitas. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

<b>¿Alguna vez tuvo posibilidad de probar alguna droga?</b>	<b>Porcentaje</b>
NINGUNA VEZ	63,7
<b>UNA VEZ</b>	<b>12,1</b>
<b>DOS O MAS VECES</b>	<b>22,6</b>
NO CONTESTA	1,6
Total	100

Más de un tercio de la población de 12 a 65 años, el 34.7%, mencionó que alguna vez tuvo la posibilidad de probar alguna droga ilícita.

Cuadro 20: Curiosidad por probar drogas ilícitas. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

¿Alguna vez sintió curiosidad por probar una droga?	Porcentaje
NO	75,2
<b>PUEDE SER</b>	<b>3,0</b>
<b>SI</b>	<b>20,5</b>
NO CONTESTA	1,3
Total	100

El 23.5% mencionó que alguna vez sintió curiosidad por probar alguna droga.

Cuadro 21: Propensión a consumir drogas ilícitas. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

¿Si tuviera ocasión, probaría una droga?	Porcentaje
NO	79,1
<b>PUEDE SER</b>	<b>1,7</b>
<b>SI</b>	<b>17,6</b>
NO CONTESTA	1,6
Total	100

El 19.3% de la población menciona que si tuviera la ocasión, probaría una droga ilegal.

Cuadro 22: Facilidad de acceso a marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Facilidad de acceso	Marihuana	Cocaína	Pasta base	Extasis
ME SERIA FACIL	45,2	34,7	26,6	21,7
ME SERIA DIFICIL	7,9	12,0	11,7	13,5
NO PODRIA CONSEGUIR	7,6	8,7	10,8	11,1
NO SE SI ES FACIL O DIFICIL	39,2	44,6	50,9	53,7
Total	100	100	100	100

Es importante el porcentaje de población que declara facilidad de acceso a drogas ilícitas, especialmente de marihuana, el 45.2%. Conseguir cocaína es fácil para el 34.7% de la población, conseguir pasta base le resulta fácil al 26.6% y conseguir éxtasis, al 21.7%.

Cuadro 23: Oferta de drogas ilícitas. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

Alguna vez le ofrecieron cocaína, marihuana, pasta base o éxtasis	Porcentaje
SI	28,4
NO	69,1
NO CONTESTA	2,5
Total	100

Casi a un tercio de la población bajo análisis alguna vez le ofrecieron alguna droga ilícita, como cocaína, marihuana, pasta base o éxtasis.

Cuadro 24: Percepción de riesgo frente al consumo de drogas ilícitas. Población 12-65 años. Localidades de 80.000 habitantes o más. Argentina 2006.

<b>Percepción del riesgo que tiene una persona que consume:</b>	<b>Ningún riesgo</b>	<b>Riesgo leve o moderado</b>	<b>Gran riesgo</b>
MARIHUANA ALGUNA VEZ	7,8	21,8	62,8
MARIHUANA FRECUENTEMTE	1,4	8,0	84,8
COCAINA ALGUNA VEZ	2,3	12,2	78,1
COCAINA FRECUENTEMENTE	0,3	1,7	92,0
PASTA BASE O PACO ALGUNA VEZ	1,0	4,8	83,8
PASTA BASE O PACO FRECUENTEMENTE	0,2	1,3	88,7
EXTASIS ALGUNA VEZ	1,2	5,8	78,7
EXTASIS FRECUENTEMENTE	0,4	1,3	84,7

La percepción de Gran Riesgo, entendido como un factor de protección para el individuo, se incrementa cuando el consumo referido es frecuente, frente a un consumo esporádico o experimental. La sustancia que tiene menor percepción de riesgo es la marihuana, probar marihuana o consumirla alguna vez, es considerada de Gran riesgo para el 62.8% de la población.