

---

# Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas

---

Principales resultados de la provincia de  
**Tierra del Fuego**



---

Argentina 2017

**Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la  
Nación Argentina (SEDRONAR)**

**Secretario de Estado  
Mg. Roberto Moro**

**Subsecretario de Estrategias de Tratamiento y  
Prevención  
Dr. Roberto Canay**

**Directora Nacional del Observatorio Argentino de  
Drogas  
Dra. María Verónica Brasesco**

**Coordinadora Área de Epidemiología  
Dra. Ernestina Rosendo**

**Coordinadora general del Estudio nacional en  
población de 12 A 65 años sobre consumo de  
sustancias psicoactivas  
Lic. Nora Cadenas**

**Análisis y redacción de informe  
Lic. Clara Kimsa**

# Índice

---

|  |    |
|--|----|
| Introducción, objetivos y metodología .....          | 5  |
| Magnitud del consumo - Resultados provinciales ..... | 11 |
| Prevalencia de vida .....                            | 12 |
| Prevalencia de año .....                             | 15 |
| Prevalencia de mes .....                             | 19 |
| Edad de inicio .....                                 | 22 |
| Síntesis de resultados .....                         | 23 |
| ANEXO: Tablas de resultados nacionales .....         | 25 |



# Introducción, objetivos y metodología

---

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) de Presidencia de la Nación, realizó a través de su Dirección Nacional del Observatorio Argentino de Drogas (DNOAD), el sexto Estudio Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de 12 a 65 años. El objetivo principal es obtener información confiable y actualizada sobre la magnitud del consumo y abuso de sustancias psicoactivas en el país, los diferentes patrones de uso, el perfil sociodemográfico de los usuarios, como así también indagar sobre la percepción de la sociedad en torno al riesgo vinculado a diferentes sustancias y su exposición al ofrecimiento de drogas.

La información proveniente de este estudio resulta necesaria para la definición de políticas públicas integrales basadas en evidencia científica, y acordes a las necesidades de toda la población, dado que posibilita estimar y caracterizar la magnitud del consumo a nivel nacional y provincial bajo procedimientos metodológicos validados científicamente. La evidencia empírica que aporta el OAD, desde éste y otros estudios, es un insumo central para la definición de las estrategias de prevención y la ampliación eficaz de la oferta de tratamiento para la problemática del consumo en todo el territorio nacional.

## Objetivos del Estudio

### Objetivo General

Obtener información actualizada sobre la magnitud del consumo y abuso de sustancias psicoactivas en el país, los diferentes patrones de uso, el perfil sociodemográfico de los usuarios, como así también poder indagar sobre la percepción que la sociedad tiene del riesgo vinculado a diferentes sustancias y su vulnerabilidad en cuanto a la exposición al ofrecimiento de drogas.

## Objetivos Específicos

- Determinar la prevalencia de vida, año y mes del consumo de drogas legales e ilegales en la población urbana de 12 a 65 años.
- Estimar la incidencia del consumo de drogas legales e ilegales en la población urbana de 12 a 65 años.
- Determinar la edad de inicio del consumo de drogas legales e ilegales en la población urbana de 12 a 65 años.
- Estimar la tasa de dependencia del consumo de drogas en la población urbana de 12 a 65 años.
- Conocer el nivel de exposición, acceso y riesgo de consumo de drogas legales e ilegales en la población urbana de 12 a 65 años.
- Estimar la demanda y acceso a servicios de orientación, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas existente en la población urbana de 12 a 65 años.
- Determinar la tendencia en el consumo en la población bajo análisis.

## Aspectos Metodológicos

El Estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de 12 a 65 años (Argentina, 2017) presenta un diseño descriptivo de tipo transversal. La recolección de datos en campo estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Rosario, bajo las indicaciones metodológicas y la supervisión del Observatorio Argentino de Drogas; todo el personal involucrado fue debida y suficientemente capacitado para la tarea asignada. El relevamiento se realizó en dos etapas: la primera, desde los primeros días de noviembre hasta la primera quincena de diciembre de 2016; la segunda, desde el 1º de febrero hasta el 25 de abril.

La elaboración del diseño muestral se realizó a partir de la definición de la Población Objetivo, comprendida entre los 12 y 65 años de edad, que habita en viviendas particulares ubicadas en localidades de 80.000 habitantes o más en todo el país. Se utilizó un muestreo trietápico, probabilístico en todas sus etapas, y estratificado en la primera etapa de selección. Las tres etapas de selección de las unidades estuvieron conformadas de la siguiente manera:

- Primera etapa: Radios Censales (en base al Censo de Población 2010)
- Segunda etapa: Viviendas particulares
- Tercera etapa: Una persona del hogar con edad entre 12 y 65 años.

El factor de expansión<sup>1</sup> utilizado corresponde al aplicado a una muestra en tres etapas y su cálculo depende del número total de personas dentro de la vivienda encuestada, del número de viviendas que tiene el radio censal escogido y del número de radios seleccionados dentro de cada estrato de la primera etapa. Todos los análisis estadísticos de los datos del estudio se realizaron empleando dichos factores de expansión y los intervalos de confianza de las estimaciones se elaboraron a un nivel del 95%.

A continuación se presenta la distribución de la población representada.

***Población de 12 a 65 años según género. Argentina 2017.***

| GÉNERO       | POBLACIÓN REPRESENTADA | %          |
|--------------|------------------------|------------|
| Varón        | 8.962.960              | 47,3       |
| Mujer        | 9.995.777              | 52,7       |
| Otro         | 1.856                  | 0,01       |
| <b>TOTAL</b> | <b>18.960.593</b>      | <b>100</b> |

***Población de 12 a 65 años según grupo de edad. Argentina 2017.***

| GRUPOS DE EDAD | POBLACIÓN REPRESENTADA | %          |
|----------------|------------------------|------------|
| 12 a 17 años   | 1.591.937              | 8,4        |
| 18 a 24 años   | 3.355.236              | 17,7       |
| 25 a 34 años   | 4.303.584              | 22,7       |
| 35 a 49 años   | 5.265.584              | 27,8       |
| 50 a 65 años   | 4.444.252              | 23,4       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18.960.593</b>      | <b>100</b> |

1. Un factor de expansión se interpreta como la cantidad de personas de la población que representa un individuo en la muestra y su determinación varía según el diseño muestral utilizado.

**Población de 12 a 65 años según provincias. Argentina 2017.**

| PROVINCIA           | POBLACIÓN REPRESENTADA | %            |
|---------------------|------------------------|--------------|
| Buenos Aires        | 9.181.936              | 48,4         |
| CABA                | 2.094.348              | 11,0         |
| Catamarca           | 123.352                | 0,7          |
| Chaco               | 302.611                | 1,6          |
| Chubut              | 175.870                | 0,9          |
| Córdoba             | 1.369.069              | 7,2          |
| Corrientes          | 226.968                | 1,2          |
| Entre Ríos          | 315.721                | 1,7          |
| Formosa             | 140.370                | 0,7          |
| Jujuy               | 198.496                | 1,0          |
| La Pampa            | 73.776                 | 0,4          |
| La Rioja            | 116.676                | 0,6          |
| Mendoza             | 834.995                | 4,4          |
| Misiones            | 203.364                | 1,1          |
| Neuquén             | 176.113                | 0,9          |
| Río Negro           | 175.373                | 0,9          |
| Salta               | 346.199                | 1,8          |
| San Juan            | 286.030                | 1,5          |
| San Luis            | 185.067                | 1,0          |
| Santa Cruz          | 62.230                 | 0,3          |
| Santa Fe            | 1.560.495              | 8,2          |
| Santiago del Estero | 227.762                | 1,2          |
| Tierra del Fuego    | 79.539                 | 0,4          |
| Tucumán             | 504.233                | 2,7          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>18960593</b>        | <b>100,0</b> |

Fuente: Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, 2017.



El instrumento fue definido por el OAD-SEDRONAR, tomando como base el Cuestionario Estandarizado del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas. La aplicación del cuestionario respetó en todos los casos las condiciones de anonimato de las respuestas brindadas. La entrevista, de una duración promedio de 25 minutos, se realizó “cara a cara”, previa explicación por parte del entrevistador del objetivo del estudio y de la relevancia del mismo. El cuestionario estuvo conformado por 193 preguntas, organizadas en las siguientes dimensiones: Identificación de la vivienda, del hogar y del entrevistado; Ingresos del hogar; Situación laboral; Salud; Consumo de tabaco; Consumo de alcohol; Factores de riesgo vinculados al consumo de alcohol y drogas; Consumo de psicofármacos; Consumo de solventes y sustancias inhalables; Consumo de drogas ilícitas: marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis y alucinógenos; Impacto del consumo de drogas; Ámbito laboral; Demanda de tratamiento; Mercado de drogas y precio.

A continuación se presentan algunas definiciones de los indicadores que son objeto de tratamiento en el presente informe.

## Indicadores de consumo

Las medidas de prevalencia indican el uso de las sustancias. Se distinguen tres tipos de prevalencia:

**Prevalencia de los últimos 30 días o del mes:** proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 30 días sobre el total de las personas estudiadas.

**Prevalencia de los últimos 12 meses o anual:** proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 12 meses sobre el total de las personas estudiadas.

**Prevalencia de vida o global:** proporción de personas que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las personas estudiadas.



# Magnitud del consumo. Resultados provinciales

---

El “**Estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas (2017)**” encuestó en la provincia de Tierra del Fuego a 807 personas en ese rango de edad. El diseño muestral de tipo representativo que enmarca este estudio habilita a expandir dicha población a 79.539 personas. De esta manera, esta investigación del Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar permite dar cuenta del estado de situación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la población entre 12 a 65 años, residentes en aglomerados de 80 mil o más habitantes de la provincia de Tierra del Fuego<sup>2</sup>, para el año 2017.

En el presente informe se comunican los primeros resultados a nivel provincial respecto de la magnitud del consumo, en base a las prevalencias de vida, año y mes, y las edades de inicio. A la vez, se presentan dichos resultados en su distribución según género y tramos de edad. En este sentido, los datos presentados permitirán construir un escenario provincial en sus trazos más generales en lo que respecta a los consumos de sustancias psicoactivas en población general. Se sugiere complementar esta información con las subsiguientes publicaciones de esta investigación así como también con datos socioeconómicos y demográficos, y otro tipo de estudios.

Por último, a la hora de analizar los resultados se recomienda utilizar como valor de referencia los resultados obtenidos para el país (presentados en el anexo), debido a que representan la tasa nacional y, por lo tanto, pueden ser considerados como un parámetro válido con el cual comparar los datos de la provincia.

La información presentada podrá ampliarse con los boletines a ser publicados en la página web del Observatorio Argentino de Drogas ([www.observatorio.gov.ar](http://www.observatorio.gov.ar)).


---

2. Las localidades que integran los aglomerados son: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

## Prevalencia de vida

La prevalencia de vida indica el porcentaje de personas que declaran haber consumido la sustancia al menos una vez en su vida sobre el total de las personas estudiadas.

**Gráfico 1. Prevalencia (%) de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**



Entre la población de 12 a 65 años que reside en localidades de 80 mil habitantes y más de la provincia de Tierra del Fuego, las sustancias que presentan mayores tasas de consumo alguna vez en la vida son alcohol (86,8%) y tabaco (59,6%). Respecto de estas dos sustancias, el consumo alguna vez en la vida de la población de Tierra del Fuego es superior al porcentaje nacional para la misma medida (81% y 51,3% respectivamente).

Respecto de las sustancias ilícitas, las tasas de prevalencia más significativas refieren al uso de marihuana y de cocaína, representando 29% y 8,1% respectivamente. Alcohol, tabaco, marihuana y cocaína son, entonces, las cuatro sustancias con mayores prevalencias de vida en Tierra del Fuego. En el caso del consumo alguna vez en la vida de marihuana, los valores de esta provincia presentan una diferencia amplia respecto de la prevalencia a nivel nacional (17,4%).

El uso alguna vez en la vida de medicamentos (tranquilizantes,

estimulantes, analgésicos opiáceos, adelgazantes, y esteroides anabolizantes) sin prescripción médica presenta distintos valores de prevalencias, de acuerdo a la sustancia: mientras que los analgésicos opiáceos señalan los valores más altos (12,4%), los tranquilizantes se ubican en un segundo lugar con 3,8%. Cabe resaltar que la prevalencia de vida de analgésicos opiáceos en Tierra del Fuego es el doble que la observada a nivel nacional (6,2%).

El consumo de adelgazantes, esteroides anabolizantes, y estimulantes presenta porcentajes de consumo alguna vez en la vida menores. El consumo alguna vez en la vida de la mayoría de estos medicamentos sin prescripción médica en la población de Tierra del Fuego se ubica levemente por debajo de la tasa nacional.

Finalmente, el 29,2% de la población bajo estudio indicó haber consumido alguna droga ilícita alguna vez en la vida.

**Cuadro 1. Prevalencia (%) de vida de consumo de sustancias psicoactivas según género. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**

\*spm: Sin prescripción médica

| SUSTANCIA                    | GÉNERO |       | TOTAL |
|------------------------------|--------|-------|-------|
|                              | VARÓN  | MUJER |       |
| Tabaco                       | 65,4   | 53,7  | 59,6  |
| Alcohol                      | 92,7   | 80,8  | 86,8  |
| Tranquilizantes spm*         | 5,1    | 2,5   | 3,8   |
| Estimulantes spm             | 0,0    | 0,1   | 0,1   |
| Analgésicos opiáceos spm     | 12,4   | 12,4  | 12,4  |
| Adelgazantes spm             | 1,8    | 3,9   | 2,8   |
| Esteroides anabolizantes spm | 1,3    | 0,2   | 0,7   |
| Solventes e inhalables       | 1,5    | 0,2   | 0,8   |
| Marihuana                    | 37,3   | 20,6  | 29,0  |
| Cocaína                      | 12,5   | 3,6   | 8,1   |
| Pasta Base - Paco            | 1,0    | 0,0   | 0,5   |
| Hashish                      | 4,3    | 0,7   | 2,5   |
| Crack                        | 0,4    | 0,0   | 0,2   |
| Éxtasis                      | 2,2    | 0,1   | 1,1   |
| Heroína                      | 0,2    | 0,0   | 0,1   |
| Opio                         | 0,4    | 0,4   | 0,4   |
| Morfina spm                  | 0,0    | 0,5   | 0,2   |
| Alucinógenos                 | 7,4    | 2,2   | 4,8   |
| Ketamina                     | 0,6    | 0,0   | 0,3   |
| Otras drogas                 | 0,2    | 0,0   | 0,1   |
| Alguna droga ilícita         | 37,4   | 20,9  | 29,2  |

Los varones presentan una tasa más elevada de consumo de alguna vez en la vida en la mayoría de las sustancias. Esta relación se presenta con más fuerza en las tasas de consumo de cocaína (12,5% de varones, frente a 3,6% de mujeres), y de marihuana (37,3% de varones, frente a 3,6% de mujeres).

Entre la población de varones, el consumo alguna vez en la vida de tabaco es más frecuente que entre las mujeres. Esta prevalencia de consumo masculino (65,4%), a su vez, presenta valores más elevados que la nacional (51,3%).

La tasa de prevalencia de vida de alcohol entre las mujeres de Tierra del Fuego (80,8%) es superior a la nacional (76,5%). En esta provincia dicho consumo presenta diferencias según género, dado que entre los varones el consumo de alcohol alguna vez en la vida alcanza a más del 90% de la población, en una diferencia porcentual similar a la observada a nivel nacional.

Sin embargo, dicha relación cambia en el caso de las prevalencias de vida de otras sustancias. Los adelgazantes sin prescripción médica, en este sentido, presentan una prevalencia de 1,8% para los varones mientras que este valor asciende a 3,9% en las mujeres. Por otra parte, el consumo de analgésicos opiáceos sin prescripción médica presenta una misma proporción en ambos géneros de personas que han respondido afirmativamente.

El consumo alguna vez en la vida de alguna droga ilícita se presenta en el 37,4% de la población de varones, mientras que sólo en el 20,9% de la de mujeres. La diferencia entre porcentajes de varones y mujeres que señalan haber realizado este consumo es más acentuada a nivel provincial que nacional.

**Cuadro 2. Prevalencia (%) de vida de consumo de sustancias psicoactivas según edad. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**

\*spm: Sin prescripción médica

| SUSTANCIA                 | EDAD    |         |         |         |         | TOTAL |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                           | 12 - 17 | 18 - 24 | 25 - 34 | 35 - 49 | 50 - 65 |       |
| Tabaco                    | 21,7    | 58,4    | 69,2    | 60,5    | 66,8    | 59,6  |
| Alcohol                   | 72,0    | 95,7    | 93,1    | 87,4    | 75,7    | 86,8  |
| Tranquilizantes spm       | 1,4     | 7,8     | 5,5     | 1,9     | 1,7     | 3,8   |
| Estimulantes spm          | 0,0     | 0,4     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,1   |
| Analgésicos opiáceos spm  | 6,6     | 19,1    | 14,4    | 7,8     | 13,3    | 12,4  |
| Adelgazantes spm          | 0,0     | 2,1     | 3,4     | 4,3     | 1,8     | 2,8   |
| Esteroides anabólicos spm | 0,0     | 1,7     | 0,4     | 0,9     | 0,6     | 0,7   |
| Solventes e inhalables    | 0,0     | 1,1     | 1,7     | 0,5     | 0,3     | 0,8   |
| Marihuana                 | 15,7    | 47,7    | 45,7    | 19,4    | 8,3     | 29,0  |

|                      |      |      |      |      |     |      |
|----------------------|------|------|------|------|-----|------|
| Cocaína              | 2,2  | 15,8 | 10,2 | 6,3  | 3,1 | 8,1  |
| Pasta Base - Paco    | 0,0  | 0,0  | 2,0  | 0,0  | 0,0 | 0,5  |
| Hashish              | 0,0  | 4,4  | 3,8  | 0,9  | 2,5 | 2,5  |
| Crack                | 0,0  | 0,0  | 0,4  | 0,4  | 0,0 | 0,2  |
| Éxtasis              | 0,0  | 0,8  | 3,4  | 0,4  | 0,0 | 1,1  |
| Heroína              | 0,0  | 0,0  | 0,4  | 0,0  | 0,0 | 0,1  |
| Opio                 | 0,0  | 1,0  | 0,9  | 0,0  | 0,0 | 0,4  |
| Morfina spm          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,9  | 0,0 | 0,2  |
| Alucinógenos         | 1,4  | 10,8 | 8,0  | 1,1  | 2,0 | 4,8  |
| Ketamina             | 0,0  | 0,0  | 1,2  | 0,0  | 0,0 | 0,3  |
| Otras drogas         | 0,0  | 0,0  | 0,3  | 0,0  | 0,0 | 0,1  |
| Alguna droga ilícita | 15,7 | 47,7 | 46,1 | 19,9 | 8,3 | 29,2 |

Las prevalencias de vida manifiestan menores valores en el grupo etario más joven, de 12 a 17 años. El consumo de tabaco y de alcohol encuentran las menores tasas de consumo entre dicha población, superando no obstante los valores de las demás sustancias para todos los tramos de edad. En el caso del alcohol se observan tasas superiores al 70% para todas las edades; en ese sentido, es significativa la prevalencia de ese consumo entre los jóvenes de 12 a 17 años (72%) por ser marcadamente más elevada que la misma medida a nivel nacional (60,5%). La población que consumió alguna vez en la vida tabaco, por otro lado, aunque supera al 60% en casi todos los tramos de edad, se concentra más fuertemente en la población de 25 a 34 años (69,2%).

Respecto al consumo alguna vez en la vida de marihuana, la mayor proporción de población se encuentra en el tramo etario entre los 18 y los 34 años (arriba del 45%). Esta misma medida para la cocaína encuentra las mayores prevalencias en un grupo de edad más temprana, de 18 a 24 años (15,8%).

El uso alguna vez en la vida de analgésicos opiáceos sin prescripción médica se presenta en toda la población, aunque más marcadamente en aquella de 18 a 24 años (19,1%).


Se observa, por último, que la prevalencia de vida de alguna droga ilícita se concentra en mayor proporción en la población de 18 a 34 años, rango en el que cerca de la mitad de la población ha consumido alguna sustancia alguna vez en la vida.

## Prevalencia de año

La prevalencia de año indica la proporción de personas que declaran haber consumido la sustancia en los últimos 12 meses anteriores al momento de responder la encuesta, sobre el total de las personas

estudiadas. Este consumo puede ser entendido como consumo reciente.

**Gráfico 2. Prevalencia (%) de año de consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**



Más de 7 de cada 10 personas de 12 a 65 años de la provincia de Tierra del Fuego han consumido alcohol en el último año. En este mismo marco temporal, el 33,3% de la población consumió tabaco y el 12,3% marihuana. La prevalencia de año de estas y otras sustancias puede ser entendida como consumo reciente.

Los porcentajes de consumo reciente de alcohol y tabaco en esta provincia (72,4% y 33,3% respectivamente) son o bien superiores o bien similares a los nacionales (68% y 31,3% respectivamente).

La prevalencia de año de cocaína es del 3%, mientras que los alucinógenos, éxtasis, y medicamentos psicofármacos sin prescripción médica presentan tasas de consumo reciente del 2% o inferiores.

Por último, el 13,1% consumió alguna droga ilícita durante los 12 meses anteriores al momento del relevamiento.



**Cuadro 3. Prevalencia (%) de año de consumo de sustancias psicoactivas según género. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**

\*spm: Sin prescripción médica

| SUSTANCIA                     | GÉNERO |       | TOTAL |
|-------------------------------|--------|-------|-------|
|                               | VARÓN  | MUJER |       |
| Tabaco                        | 38,3   | 28,3  | 33,3  |
| Alcohol                       | 82,7   | 61,9  | 72,4  |
| Esteroides anabolizantes spm* | 0,6    | 0,0   | 0,3   |
| Tranquilizantes spm*          | 0,1    | 0,6   | 0,4   |
| Marihuana                     | 16,4   | 8,2   | 12,3  |
| Cocaína                       | 4,9    | 1,1   | 3,0   |
| Éxtasis                       | 0,9    | 0,0   | 0,5   |
| Alucinógenos                  | 3,8    | 0,3   | 2,0   |
| Otras drogas                  | 0,2    | 0,0   | 0,1   |
| Alguna droga ilícita          | 17,8   | 8,4   | 13,1  |

Las tasas de prevalencia de consumo reciente según género muestran un patrón similar al observado respecto del consumo alguna vez en la vida en lo relacionado al tabaco y al alcohol: el consumo en el último año presenta valores más elevados en el caso de los varones, especialmente en el caso del alcohol (82,7% de los varones, frente al 61,9% de las mujeres).

El patrón según género se mantiene, a su vez, respecto al consumo de marihuana y cocaína. La proporción de población masculina que declaró consumo reciente de estas sustancias es el doble que la proporción femenina. Esta relación es similar a los valores a nivel nacional.

Por último, el consumo reciente de alguna droga ilícita es fuertemente más pronunciado entre los varones.

**Cuadro 4. Prevalencia (%) de año de consumo de sustancias psicoactivas según edad. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**

\* sin prescripción médica

| SUSTANCIA                  | EDAD    |         |         |         |         | TOTAL |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                            | 12 - 17 | 18 - 24 | 25 - 34 | 35 - 49 | 50 - 65 |       |
| Tabaco                     | 11,4    | 42,5    | 37,0    | 35,8    | 26,9    | 33,3  |
| Alcohol                    | 65,7    | 80,2    | 84,9    | 70,5    | 52,6    | 72,4  |
| Esteroides anabólicos spm* | 0,0     | 1,7     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,3   |
| Tranquilizantes spm*       | 0,0     | 0,0     | 0,3     | 0,6     | 0,7     | 0,4   |
| Marihuana                  | 5,9     | 28,6    | 17,7    | 5,9     | 1,7     | 12,3  |
| Cocaína                    | 2,2     | 10,2    | 1,8     | 1,6     | 0,0     | 3,0   |
| Éxtasis                    | 0,0     | 0,0     | 1,9     | 0,0     | 0,0     | 0,5   |
| Alucinógenos               | 0,0     | 5,7     | 3,7     | 0,2     | 0,0     | 2,0   |
| Otras drogas               | 0,0     | 0,0     | 0,3     | 0,0     | 0,0     | 0,1   |
| Alguna droga ilícita       | 8,1     | 30,2    | 18,3    | 6,2     | 1,7     | 13,1  |

Considerando el consumo reciente según la edad, se observa que en todos los casos, excepto el de los tranquilizantes sin prescripción médica, las tasas más altas se concentran en la población de 18 a 24 años. Este patrón se mantiene a nivel nacional, con la excepción del tabaco que presenta un consumo mayor en la población de 25 a 34 años.

Más del 80% de la población de 18 a 34 años de la provincia señaló tener consumo reciente de alcohol. Adicionalmente, el porcentaje de población de 12 a 17 años que presenta este consumo es de más del 65%.

El consumo en el último año de marihuana, por otro lado, se presenta en el 28,6% de los jóvenes entre 18 y 24 años.


Las prevalencias de consumo de alcohol y marihuana en el último año, adicionalmente, manifiestan valores descendentes a partir de los 34 años.

El 30,2% de la población de 18 a 24 años señaló haber tenido consumo reciente de alguna droga ilícita, proporción superior al porcentaje nacional para este grupo de edad (16,1%).

## Prevalencia de mes

La prevalencia de mes o consumo actual, indica el porcentaje de personas que declaran haber consumido la sustancia en los últimos 30 días anteriores a responder el cuestionario, sobre el total de las personas estudiadas.

**Gráfico 3. Prevalencia (%) de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**



Respecto de las tasas de prevalencia de mes, o consumo actual, en la provincia de Tierra del Fuego, se observa que las sustancias con mayores valores son el alcohol (56,1%) y el tabaco (29,5%). La marihuana (7,4%) es la tercera sustancia de mayor consumo actual. El consumo en el último mes de marihuana presenta en esta provincia una prevalencia mayor a la nacional (5,4%).

Las prevalencias de mes de cocaína, éxtasis y alucinógenos, por su parte, se observan en menos del 1% de la población.

Finalmente, el análisis señala que el 7,6% de la población consumió alguna droga ilícita en el último mes.

**Cuadro 5. Prevalencia (%) de mes de consumo de sustancias psicoactivas según género. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**

\* sin prescripción médica

| SUSTANCIA            | GÉNERO |       | TOTAL |
|----------------------|--------|-------|-------|
|                      | VARÓN  | MUJER |       |
| Tabaco               | 35,6   | 23,3  | 29,5  |
| Alcohol              | 67,4   | 44,8  | 56,1  |
| Tranquilizantes spm* | 0,0    | 0,2   | 0,1   |
| Marihuana            | 10,0   | 4,7   | 7,4   |
| Cocaína              | 0,6    | 0,5   | 0,5   |
| Éxtasis              | 0,2    | 0,0   | 0,1   |
| Alucinógenos         | 0,7    | 0,0   | 0,3   |
| Alguna droga ilícita | 10,3   | 4,7   | 7,6   |

El consumo actual de sustancias en la provincia de Tierra del Fuego presenta patrones según género similares a los datos respecto del consumo reciente. Sin embargo, se observa que en el consumo actual de alcohol se profundiza la diferencia entre géneros: mientras el 67,4% de los varones indicó consumo de alcohol en el último mes, dicha proporción fue del 44,8% entre las mujeres. Este patrón que implica un consumo mayor en la población masculina se mantiene para el caso del tabaco.

El consumo actual de marihuana en Tierra del Fuego, a su vez, se presenta con más frecuencia entre los varones, siendo la proporción de varones consumidores de esta sustancia el doble que la misma medida en la población femenina. Lo mismo ocurre respecto del consumo de alguna droga ilícita: el 10,3% de los varones respondió afirmativamente sobre este consumo en el último mes.

**Cuadro 6. Prevalencia (%) de mes de consumo de sustancias psicoactivas según edad. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**

\* sin prescripción médica

| SUSTANCIA            | EDAD    |         |         |         |         | TOTAL |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                      | 12 - 17 | 18 - 24 | 25 - 34 | 35 - 49 | 50 - 65 |       |
| Tabaco               | 7,5     | 36,3    | 31,2    | 33,8    | 25,2    | 29,5  |
| Alcohol              | 23,4    | 70,1    | 70,8    | 53,4    | 43,1    | 56,1  |
| Tranquilizantes spm* | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,7     | 0,1   |
| Marihuana            | 1,3     | 17,6    | 10,7    | 3,9     | 1,1     | 7,4   |
| Cocaína              | 0,0     | 0,0     | 1,1     | 0,9     | 0,0     | 0,5   |
| Éxtasis              | 0,0     | 0,0     | 0,3     | 0,0     | 0,0     | 0,1   |
| Alucinógenos         | 0,0     | 0,0     | 1,3     | 0,0     | 0,0     | 0,3   |
| Alguna droga ilícita | 1,3     | 17,6    | 11,3    | 3,9     | 1,1     | 7,6   |

Por otra parte, las prevalencias de consumo actual de tabaco y alcohol se concentran fuertemente a partir de los 18 años. El consumo actual de tabaco entre los 18 y los 49 años, por ejemplo, se presenta en más del 30% de las personas de ambos sexos en la provincia, mientras que más del 70% de la población entre 18 y 34 años consumen actualmente alguna bebida alcohólica. En ambos casos, las prevalencias de mes más bajas se encuentran en la población de 12 a 17 años.

Sin embargo, resalta la proporción de jóvenes con consumo reciente de alcohol: cerca de un cuarto de la población de 12 a 17 años declaró haber consumido alguna bebida alcohólica en el último mes.

El 17,6% de los jóvenes de 18 a 24 años consume actualmente marihuana.

Finalmente, el 17,6% de los jóvenes de 18 a 24 manifiestan consumo actual de alguna droga ilícita.

## Edad de inicio

**Cuadro 7. Medidas estadísticas de la edad de inicio de consumo de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína según género. Población de 12 a 65 años. Tierra del Fuego 2017.**

| GÉNERO       | MEDIA        | MEDIANA      | MODA         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TABACO       |              |              |              |
| <b>Total</b> | <b>15,75</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> |
| Varones      | 15,53        | 15,00        | 12,00        |
| Mujeres      | 16,03        | 16,00        | 15,00        |
| ALCOHOL      |              |              |              |
| <b>Total</b> | <b>16,25</b> | <b>16,00</b> | <b>15,00</b> |
| Varones      | 15,83        | 15,00        | 15,00        |
| Mujeres      | 16,74        | 16,00        | 15,00        |
| MARIHUANA    |              |              |              |
| <b>Total</b> | <b>19,00</b> | <b>17,00</b> | <b>15,00</b> |
| Varones      | 18,13        | 17,00        | 15,00        |
| Mujeres      | 20,58        | 18,00        | 18,00        |

La edad de inicio promedio en el consumo de tabaco y alcohol se ubica entre los 15 años y los 17 años. El inicio en el consumo de estas sustancias en la provincia de Tierra del Fuego es similar a la que se presenta a nivel nacional.

Considerando el género, se observa que los varones se inician en el consumo de tabaco a una edad más temprana que las mujeres, manteniéndose este patrón para el consumo de alcohol.

A propósito del consumo de marihuana, la población relevada en esta provincia señala una edad de inicio promedio de 19 años. En este caso, la relación entre varones y mujeres mantiene el patrón relativo al consumo de tabaco y alcohol, siendo el inicio en el consumo de marihuana más temprano entre los varones que entre las mujeres.

En las tres sustancias bajo análisis, las edades de inicio son similares a las que se observan a nivel nacional.

# Síntesis de resultados

---

En este informe se han presentado los primeros resultados sobre la magnitud del consumo en la provincia de Tierra del Fuego, en base a las prevalencias de vida, año y mes, y las edades de inicio. Adicionalmente, dichos resultados se han analizado en su distribución según género y tramos de edad.

Se obtuvieron los siguientes resultados principales:

- » Entre la población de 12 a 65 años que reside en localidades de 80 mil habitantes y más de la provincia de Tierra del Fuego, el 86,8% consumió alguna vez en la vida alcohol, y el 59,61% fumó tabaco alguna vez en la vida. Las prevalencias de vida de marihuana y cocaína, por otro lado, son 29% y 8,1% respectivamente.
- » Más de 7 de cada 10 personas señaló consumo reciente de alcohol, y el 33,3% lo hizo respecto del tabaco. El 12,3% de la población bajo estudio presenta consumo de marihuana en el último año.
- » Más de la mitad de la población de 12 a 65 años de la provincia consume actualmente alcohol. A su vez, el 29,5% de la población es consumidora actual de tabaco, y el 7,4% de marihuana.
- » Los varones presentan una tasa más elevada de consumo en la mayoría de las sustancias, con mayor intensidad en lo relativo a la marihuana. Esta sustancia presenta proporciones de consumidores recientes y actuales de marihuana entre los varones que llega al doble respecto de las mujeres. En la población bajo análisis, la proporción de mujeres y varones que han consumido alcohol alguna vez en la vida es similar, diferenciándose los consumos entre varones y mujeres cuánto más reciente es la ingesta. Las prevalencias de año y mes de esta sustancia son, en consecuencia, más marcadas entre los varones. De igual modo, se observa que el consumo reciente y actual de alguna droga ilícita es más frecuente entre varones.
- » El consumo reciente de tabaco, alcohol y marihuana se concentra entre los 18 y los 35 años: más de 7 cada 10 jóvenes en ese grupo etario indicó consumo reciente de alcohol. Por otro lado, más del 20% de los jóvenes de 12 a 17 años consumió alguna bebida alcohólica en el último año. El consumo actual de alguna droga ilícita se presenta con más fuerza en el tramo de edad entre los 18 y los 24 años.
- » La edad promedio de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana se ubica entre los 15 y los 19 años, según la sustancia. Así, la sustancia de inicio en el consumo más temprano es el tabaco (cerca de los 16 años). El inicio en el consumo de estas sustancias es más temprano en la población de varones.





# ANEXO: Tablas de resultados nacionales

*Prevalencia (%) de vida de consumo de sustancias psicoactivas, según género y edad. Población de 12 a 65 años. Argentina, 2017.*

| SUSTANCIA                     | GÉNERO |       | GRUPO DE EDAD |       |       |       |       | TOTAL |
|-------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               | VARÓN  | MUJER | 12-17         | 18-24 | 25-34 | 35-49 | 50-65 |       |
| Tabaco                        | 55,2   | 47,8  | 19,0          | 47,7  | 56,3  | 52,4  | 59,3  | 51,3  |
| Alcohol                       | 86,0   | 76,5  | 60,5          | 88,1  | 86,3  | 80,6  | 78,5  | 81,0  |
| Tranquilizantes spm*          | 4,0    | 2,5   | 0,8           | 3,8   | 5,0   | 3,8   | 1,3   | 3,2   |
| Estimulantes spm*             | 0,3    | 0,1   | 0,1           | 0,6   | 0,3   | 0,0   | 0,0   | 0,2   |
| Analgésicos opiáceos spm*     | 5,9    | 6,5   | 2,6           | 6,3   | 6,4   | 7,0   | 6,2   | 6,2   |
| Adelgazantes spm*             | 0,7    | 2,7   | 0,2           | 0,8   | 1,9   | 2,2   | 2,4   | 1,8   |
| Esteroides anabolizantes spm* | 0,5    | 0,2   | 0,1           | 0,4   | 0,5   | 0,4   | 0,1   | 0,3   |
| Solventes e Inhalables        | 1,5    | 0,2   | 0,2           | 1,4   | 0,8   | 0,9   | 0,5   | 0,8   |
| Marihuana                     | 21,4   | 13,9  | 8,6           | 29,3  | 26,8  | 15,5  | 4,8   | 17,4  |
| Cocaína                       | 8,2    | 2,7   | 1,2           | 6,5   | 7,7   | 6,4   | 2,1   | 5,3   |
| Pasta Base y/o Paco           | 0,9    | 0,2   | 0,2           | 1,0   | 0,7   | 0,5   | 0,1   | 0,5   |
| Hashish                       | 2,3    | 1,0   | 0,3           | 1,3   | 3,0   | 2,2   | 0,4   | 1,6   |
| Crack                         | 0,4    | 0,1   | 0,0           | 0,4   | 0,4   | 0,2   | 0,1   | 0,2   |
| Éxtasis                       | 1,6    | 1,1   | 0,3           | 2,4   | 2,2   | 1,3   | 0,0   | 1,3   |
| Heroína                       | 0,1    | 0,0   | 0,0           | 0,2   | 0,0   | 0,0   | 0,1   | 0,1   |
| Opio                          | 0,2    | 0,1   | 0,0           | 0,0   | 0,1   | 0,2   | 0,2   | 0,1   |
| Morfina spm                   | 0,1    | 0,0   | 0,0           | 0,0   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Alucinógenos                  | 3,2    | 1,5   | 0,5           | 4,3   | 4,3   | 1,8   | 0,1   | 2,3   |
| Ketamina                      | 0,9    | 0,7   | 0,0           | 1,9   | 1,2   | 0,5   | 0,1   | 0,8   |
| Otras drogas                  | 0,3    | 0,0   | 0,0           | 0,3   | 0,4   | 0,1   | 0,0   | 0,2   |
| Alguna droga ilícita          | 22,6   | 14,4  | 8,8           | 30,1  | 27,5  | 16,5  | 5,9   | 18,3  |

\* spm: Sin prescripción médica.

**Prevalencia (%) de año de consumo de sustancias psicoactivas, según género y edad.  
Población de 12 a 65 años. Argentina, 2017.**

| SUSTANCIA                     | GÉNERO |       | GRUPO DE EDAD |         |         |         |         | TOTAL |
|-------------------------------|--------|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                               | VARÓN  | MUJER | 12 - 17       | 18 - 24 | 25 - 34 | 35 - 49 | 50 - 65 |       |
| Tabaco                        | 35,4   | 27,7  | 13,3          | 33,5    | 35,9    | 34,0    | 28,5    | 31,3  |
| Alcohol                       | 74,2   | 62,3  | 53,8          | 78,9    | 73,8    | 66,4    | 60,9    | 68,0  |
| Esteroides anabolizantes spm* | 0,2    | 0,1   | 0,0           | 0,3     | 0,1     | 0,0     | 0,2     | 0,1   |
| Tranquilizantes spm*          | 0,6    | 0,9   | 0,6           | 0,9     | 1,4     | 0,4     | 0,3     | 0,7   |
| Estimulantes spm*             | 0,2    | 0,0   | 0,0           | 0,2     | 0,2     | 0,0     | 0,0     | 0,1   |
| Solventes e Inhalables        | 0,1    | 0,0   | 0,1           | 0,1     | 0,2     | 0,0     | 0,0     | 0,1   |
| Marihuana                     | 10,7   | 5,2   | 4,9           | 15,9    | 13,3    | 4,9     | 0,9     | 7,8   |
| Cocaína                       | 2,4    | 0,7   | 0,4           | 3,0     | 1,9     | 1,7     | 0,3     | 1,5   |
| Pasta Base y/o Paco           | 0,3    | 0,0   | 0,0           | 0,4     | 0,0     | 0,2     | 0,0     | 0,1   |
| Éxtasis                       | 0,4    | 0,2   | 0,1           | 0,9     | 0,4     | 0,2     | 0,0     | 0,3   |
| Alucinógenos                  | 1,0    | 0,2   | 0,1           | 1,9     | 1,0     | 0,0     | 0,0     | 0,6   |
| Otras drogas                  | 0,0    | 0,0   | 0,0           | 0,0     | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Alguna droga ilícita          | 11,5   | 5,4   | 5,0           | 16,1    | 13,5    | 6,1     | 1,0     | 8,3   |

\* spm: Sin prescripción médica.

**Prevalencia (%) de mes de consumo de sustancias psicoactivas, según género y edad. Población de 12 a 65 años. Argentina, 2017.**

| SUSTANCIA                     | GÉNERO |       | GRUPO DE EDAD |         |         |         |         | TOTAL |
|-------------------------------|--------|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                               | VARÓN  | MUJER | 12 - 17       | 18 - 24 | 25 - 34 | 35 - 49 | 50 - 65 |       |
| Tabaco                        | 32,2   | 25,3  | 11,8          | 28,8    | 32,3    | 31,8    | 26,9    | 28,6  |
| Alcohol                       | 62,6   | 44,2  | 34,7          | 62,1    | 57,7    | 51,7    | 49,5    | 52,9  |
| Esteroides anabolizantes spm* | 0,0    | 0,0   | 0,0           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Tranquilizantes spm*          | 0,4    | 0,4   | 0,0           | 0,7     | 0,6     | 0,3     | 0,3     | 0,4   |
| Estimulantes spm*             | 0,1    | 0,0   | 0,0           | 0,1     | 0,2     | 0,0     | 0,0     | 0,1   |
| Solventes e Inhalables        | 0,1    | 0,0   | 0,0           | 0,0     | 0,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Marihuana                     | 7,8    | 3,3   | 2,8           | 12,0    | 9,5     | 3,0     | 0,3     | 5,4   |
| Cocaína                       | 1,0    | 0,4   | 0,1           | 1,4     | 0,8     | 0,9     | 0,1     | 0,7   |
| Pasta Base y/o Paco           | 0,1    | 0,0   | 0,0           | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Éxtasis                       | 0,1    | 0,1   | 0,0           | 0,5     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,1   |
| Alucinógenos                  | 0,5    | 0,0   | 0,0           | 0,6     | 0,6     | 0,0     | 0,0     | 0,2   |
| Otras drogas                  | 0,0    | 0,0   | 0,0           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Alguna droga ilícita          | 8,3    | 3,4   | 2,9           | 12,1    | 9,9     | 3,7     | 0,3     | 5,7   |

\* spm: Sin prescripción médica.

**Medidas estadísticas de la edad de inicio de consumo de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y otras sustancias psicoactivas, según género. Población de 12 a 65 años. Argentina 2017.**

| SUSTANCIA                   | MEDIA       | MEDIANA     | MODO        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TABACO</b>               |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>16,7</b> | <b>16,0</b> | <b>15,0</b> |
| Varones                     | 16,3        | 16,0        | 15,0        |
| Mujeres                     | 17,0        | 16,0        | 15,0        |
| <b>ALCOHOL</b>              |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>17,3</b> | <b>17,0</b> | <b>15,0</b> |
| Varones                     | 16,7        | 16,0        | 15,0        |
| Mujeres                     | 17,9        | 17,0        | 18,0        |
| <b>TRANQUILIZANTES SPM*</b> |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>24,8</b> | <b>22,0</b> | <b>18,0</b> |
| Varones                     | 23,8        | 20,0        | 16,0        |
| Mujeres                     | 26,1        | 24,0        | 25,0        |
| <b>ANALGÉSICOS OPIÁCEOS</b> |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>20,0</b> | <b>18,0</b> | <b>20,0</b> |
| Varones                     | 19,46       | 18,00       | 20,0        |
| Mujeres                     | 20,32       | 18,00       | 20,0        |
| <b>ALUCINÓGENOS</b>         |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>19,6</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| Varones                     | 19,4        | 20,0        | 20,0        |
| Mujeres                     | 19,9        | 20,0        | 20,0        |
| <b>MARIHUANA</b>            |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>18,6</b> | <b>18,0</b> | <b>17,0</b> |
| Varones                     | 18,2        | 17,0        | 18,0        |
| Mujeres                     | 19,2        | 18,0        | 17,0        |
| <b>COCAÍNA</b>              |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>20,1</b> | <b>19,0</b> | <b>20,0</b> |
| Varones                     | 20,4        | 19,0        | 20,0        |
| Mujeres                     | 19,4        | 19,0        | 20,0        |
| <b>ÉXTASIS</b>              |             |             |             |
| <b>Total</b>                | <b>22,1</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| Varones                     | 22,3        | 20,0        | 28,0        |
| Mujeres                     | 21,8        | 21,0        | 20,0        |

\* spm: Sin prescripción médica.









*Si conocés a alguien que  
necesita ayuda llamá al*

 **141**



@Sedronar



/Sedronar



@Sedronar



/Sedronar